

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir, ni respirar el polvo o la aspiración.
- Evitar el contacto con ojos, piel y ropa.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambiarse, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o lomajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas, ni alimentos.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Dinitroanilina.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En contacto con los ojos lavelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU: 106 / FARMAGRO: 614 1500  
CISPROQUIM: 080 050 847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse. Despues de usar, el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inútilicelo triturándolo o perforándolo y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar coligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, incluyendo algas y plantas acuáticas y seres acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otros fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación de acuerdo a la guía de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna silvestre y vestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto, inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable (EC)**

**Composición:**

Pendimethalin ..... 400ml/csp. 1L

Aditivos ..... csp. 1L

Registro PQUA N° 1155 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.  
Av. Principal 2, Mz. 05 (Lote 3B, 4 y 5)  
Z.I. Huachipa Este, San Antonio - Huacho Chir., Lima  
Central: (01) 614 1500

**FARMAGRO**

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES DOSECHOS

Formulador: WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Center, Shunhua Road 750,  
Jinan, Shandong, CHINA

Contenido Neto: 1L

Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

AMARELO 400EC es un herbicida preemergente sistémico del grupo de las dinitroanilinas que afecta la germinación de las semillas de las malezas, inhibiendo el crecimiento de brotes y raíces causandoles la muerte.

AMARELO 400EC, se aplica con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Producir una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de agua e utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto u completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. Aplicar al suelo, cuando el campo se encuentra en su etapa temprana. Se recomienda realizar un riego posterior a la aplicación. Usar boquilla de chorro fino.

"CONSULE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	Periodo de Carenza (días)		
			Nombre Común	Nombre Científico	LMR (ppm)
CEVADA	Pata de gallo Verdejiga Yuyo Pega Pega	Eleusine indica Portulaca oleracea Amaranthus dubius Setaria verticillata	2.5	60	0.05
CÁÑA DE AZÚCAR	Amoroso Verdolaga Yuyo	Bidens pilosa Portulaca oleracea Amaranthus hybridus	2.4**	90	0.05
ALCACHOFRA	Hierba de gallinazo Chamizo Verdolaga Pega Pega Coquín	Bidens pilosa Chenopodium murale Datura stramonium Portulaca oleracea Setaria verticillata Cyperus rotundus	2.0**	200	0.1

LMR: Límite Máximo de Residuos      (\*) Gestio de agua: 200L/ha

\*\*gasto de agua máx. 400L/ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar al suelo, cuando las malezas están en etapa de germinación.
- Realizar como máximo 1 aplicación por la campaña. Considerando 2 campañas al año (en el cultivo de cebolla).
- En el cultivo de alcachofa se recomienda una sola aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.
- En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar resistencia.

**PERÍODO DE REINGRESO**

Se puede regresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

AMARELO 400EC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían mostrar fitotoxicidad en el cultivo.

Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA**