

Etiqueta AMARELO 400 EC x 20L

28.7cm x 15cm 24.05.18

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es dañino, no ingerir, ni respirar el polvo o la aspersión.
-Evitar el contacto con ojos, piel y ropa.
-Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
-No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
-No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas, ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo químico: Dinitroaniline.
-En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
-En ingestión, enjuagar la boca con agua si esta consciente. No provoque el vómito.
-En contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
-En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
-Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
-Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
ESSALUD: 411 8000 (Opción 4) INFOSALUD: 0800-10-828
CICOTOX: 0800-1-3040 CETOX: 273 2318 / 999 072 933

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, incluyendo algas y plantas acuáticas y semi-acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

AMARELO 400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:
Pendimethalin 400g/L
Aditivos csp 1L

Registro PQUA N° 1155 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.
Av. Alfredo Mendiola N° 6068, Los Olivos. Lima, Perú
Telefono: 614-1500 / Fax: 614-1517



FORMULADOR:
JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
N° 309, Changfenghe, Nanjing Chemical Industry Park. Nanjing, China.

Contenido Neto: 20L
Lote

Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AMARELO 400EC es un herbicida preemergente sistémico del grupo de las dinitroanilinas que afecta la germinación de las semillas de las malezas, inhibiendo el crecimiento de brotes y raíces, causandoles la muerte.
AMARELO 400EC, se aplica con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto u completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. Aplicar al suelo, cuando el campo se encuentre en capacidad de campo, de lo contrario realizar un riego posterior a la aplicación. Usar boquillas de abanico plano.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	Periodo de Carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/Ha		
CEBOLLA	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	2.5	60	0.05
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>			
	Yuyo	<i>Amaranthus dubius</i>			
	Pega Pega	<i>Setaria verticillata</i>			

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
-Aplicar al suelo, cuando las malezas están en etapa de germinación.
-Realizar como máximo 1 aplicaciones por campaña. Considerando 2 campañas al año.
-La dosis máxima es de 2.5 L/ha
-En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO
Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD
AMARELO 400EC es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD
No se observaron síntomas de fitotoxicidad cuando fue aplicado en el cultivo y a la dosis recomendada..

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

