LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es peligroso si se inhala. Evite respirar la aspersión.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, manipulación, aplicación y para ingresar al ambiente de tratamiento en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado, lejos de la casa.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No utilizar el envase vacio para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Triazole + Estrobirulina

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta.
- En ingestión, no provoque el vomito, si el paciente esta inconsciente no dar de beber.
- En contacto con los ojos lavelos inmediatamente con agua limpia durante varios minutos.
- En contacto con la piel, quitar al ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciencia a un lugar fresca y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antidoto: No tiene, dar tratamiento sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 13040 **ESSALUD:** 0801- 10200 (ó 117)
CIPROSQUIM: 0800 - 5- 0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No enterrar los envases ni los desechos del producto en el suelo.
- No aplicar en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el ambiente.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ARGENTO

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición Química:

Tebuconazole ..... 200 g/L
Kresoxim metil ..... 125 g/L
Aditivos ..... csp 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular de Registro: **RED SURCOS PERU SAC**
Cal. Manuel Bonilla Nro. 125 Dpto. 1-b
Miraflores - Lima
Telefonos: 5120030

Formulado por: **CHIMAGRO SA**
Av. La Carolina 517- (B1891BOE) Florencio Varela
Buenos Aires- Argentina
Tel / Fax: (54) – 02229- 49-1276/1311

Importado y Distribuido por: **RED SURCOS PERU SAC**
Cal. Manuel Bonilla Nro. 125 Dpto. 1-b
Miraflores - Lima
Telefonos: 5120030

Contenido Neto:
Lote N°.
F. de Form.
F. de Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARGENTO es un fungicida sistemico, compuesto de tebuconazole y kresoxim metil, por lo que tiene doble acción inhibe la germinación de las esporas, el crecimiento del micelio y esporas y además impide la sintesis del ergosterol y por ello la formación de membranas celulares del hongo.

ARGENTO se aplica en aspersion con equipos terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. calibrar el equipo previamente. aplicar manteniendo el sistema de agitación constante.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos y dosis:

CULTIVO	Plagas		Dosis L/ cil	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
PAPRIKA	"Moho gris"	*Botrytis cinerea*	0.2	14	0.5 * 1.0 **

LMR: Límite Máximo de Residuos. **PC**: Período de Carencia.
* LMR de Krexosim metil
**LMR de Tebuconazole

FRECUENCIA Y APLICACIÓN

• Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del hongo o a la presencia de los síntomas iniciales de la enfermedad. Como máximo 1 aplicación/ campaña. Considerando como máximo 2 campañas/año.
• De persistir la plaga, usar otro fungicida de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la generación de resistencia.
• La dosis máxima de aplicación es 0.6 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

ARGENTO es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa. Si se tiene duda consulte con un ingeniero agrónomo o a la empresa proveedora.

FITOTOXICIDAD

ARGENTO no es fitotoxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO