

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Propiedades físicas y químicas del producto formulado

Formulado por

OASIS AGROSCIENCE LIMITED

22F, Liangfeng Plaza N°8, Dongfang Road,

Pudong District, Shanghai, China.

Telf.: 021-58357653-804

Apariencia: Liquido amarillo-marrón

Olor: Ligero Olor

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de manipuleo y almacenamiento.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- · Este producto es de cuidado no Ingerir.
- Peligroso si es Inhalado. Evite respirar (polvo, vapor. aspersión).
- · No comer, beber o fumar durante las operaciones de Mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada v báñese con abundante agua v Jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos. medicinas, ni forraie.
- · Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua de consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- · Grupo químico: Imidazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, no inducir al paciente al vómito.
- · En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático

Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) ESSALUD: 117 (gratuito) CIPR05QUIM: 0800-5-0847 COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.: 253-6444

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

 Después de usar el contenido, enjuaque tres veces el envase y vierta la solución

en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo deposítelos en el lugar destinado por las autoridades

- locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- · No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacía cuerpos de agua de al menos de 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias
- para controlar la deriva. • En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CADETE 45% EC es un fungicida que inhibe la biosíntesis de ergosterol lo cual incrementa la permeabilidad de la membrana citoplasmática y altera la biosíntesis de la guitina, bloquea el desarrollo del micelio e inhibe la función de los haustorios por lo cual el hongo deja de alimentarse y muere.

CADETE® 45% EC se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad

Rotar con fungicidas de diferente modo de acción para evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación. COMPATIBILIDAD

CADETE® 45% EC no es compatible con los de reacción alcalina, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

FITOTOXICIDAD

No es fitotoxico a la dosis y usos recomendados en esta etiqueta. RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido eneste envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa v maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS					
	Nombre Común	Nombi	e Técnico	DOSIS ml / 200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
Pimiento	"Botritis"	Botryt	is cinerea	200 - 250	15	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia



FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC