

CADETE®

45% EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

COMPOSICIÓN:

Prochloraz..... 450 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. P.QUA Nº 1157 - SENASA

NO INFLAMABLE


NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Formula empírica: C₁₁H₁₀Cl₂N₂O₂
Peso molecular: 376.7
Formula estructural:



Titular de Registro:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579, Oficina 702,
Edificio del Park I,
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444

Importado y Distribuido por:
GRUPO ANDEX S.A.C.
Av. Benavides 1579, Oficina 702,
Edificio del Park I,
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444

Formulado por:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
22F, Liangfeng Plaza N°9, Dongfang Road, Pudong District,
Shanghai, China. Telf.: 021-58357653-804



“LEA ESTA HOJA
INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Propiedades físicas y químicas del producto formulado

pH: 5-7

Apariencia: Líquido amarillo-marrón

Olor: Ligero Olor

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de manipuleo y almacenamiento.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor, aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado,
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y Jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, no inducir al paciente al vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

Teléfonos de emergencia:
ESSALUD: 117 (gratuito)
CIPROQUIM: 0800-5-0847

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.: 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CADETE 45% EC es un fungicida que inhibe la biosíntesis de ergosterol lo cual incrementa la permeabilidad de la membrana citoplasmática y altera la biosíntesis de la quitina, bloquea el desarrollo del micelio e inhibe la función de los haustorios por lo cual el hongo deja de alimentarse y muere.

CADETE 45% EC se aplica en aspersión con cualquier equipo de aplicación terrestre, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura de las plantas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Rotar con fungicidas de diferente modo de acción para evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
CADETE 45% EC no es compatible con los de reacción alcalina, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico a la dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS ml / 200 L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Pimiento	“Botritis”	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 250	15	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

PC: Período de carencia

CADETE®

45% EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC