

PRIDMERO[®] 20 SP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Acetamiprid 200 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Número de Registro: PQUA N° 883 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:

**SHANGHAI KELINON
AGROCHEMICAL CO., LTD**
1201, Jinling Int'1 Mansion, Ouyang Road, Hongkou,
CHINA

Importador: CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333. Of. "E"
Miraflores - Lima. www.capeagro.com

Contenido
Neto: **100 g**

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos.

Durante la manipulación y aplicación del producto uso ropa protectora, delantal impermeable, guantes, botas, mascarilla o tapaboca, y para reingresar al área tratada..

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco alejado del calor y bajo llave.

No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: NEONICOTINOIDES

En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico (oftalmólogo).

En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. Monitorear la dificultad respiratoria. Avisar al personal médico.

En caso de ingestión: si la víctima está conciente y alerta dar de beber 2-3 vasos de agua e inducir al vómito tocándose la garganta con el dedo. No inducir al vómito o dar algo por la boca a una persona inconsciente. No dejar a la víctima desatendida. Llevar inmediatamente para la atención médica.

Tratamiento: No tiene antidoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE DE USO Y MANEJO

PRIDMERO 20 SP tiene efecto sobre los organismos plaga actuando como insecticida sistémico con actividad traslaminar y con acción por contacto y estomacal.

Modo de preparación: Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	kg/200L de agua	kg/ha		
Páprica	"mosquilla de los brotos"	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.15 - 0.2	0.3-0.45	7	0.3

* PC: Periodo de Carenia.

**LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Realizar dos aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de reacción neutra. Sin embargo, las mezclas con productos alcalinos y compuestos a base de cobre no son compatibles. En caso de dudas, se debe hacer un ensayo previo.

FITOTOXICIDAD: En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectados respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

