

SuperAct[®] 25 WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Thiamethoxam 250 g / Kg
Aditivos de formulación c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 900 - SENASA

FORMULADO POR:

**SHANGHAI KELINON
AGROCHEMICAL CO., LTD**
1201, Jinling Int'l Mansion, Ouyang Road, Hongkou.
CHINA

TITULAR DEL REGISTRO: CAPEAGRO S.A.C.



Importador: CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333. Of. "E"
Miraflores - Lima. www.capeagro.com

Contenido
Neto: **1 Kg**

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos.

Durante la manipulación y aplicación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, antiparras, guantes, botas, mascarilla o tapaboca, y para reingresar al área tratada..

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación

Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco alejado del calor y bajo llave.

No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: NEONICOTINOIDE

En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua por 15 a 20 minutos.

En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados abiertos. Llevar al médico (oftalmólogo).

En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. Monitorear la dificultad respiratoria. Avisar al personal médico.

En caso de ingestión: No inducir al vómito o dar algo por la boca a una persona inconsciente. No dejar a la víctima desatendida. Llevar inmediatamente para la atención médica.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para las abejas, no aplicar en plena floración.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.

No debe aplicarse en zonas con napa freática alta.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Aplicar de preferencia por las mañanas.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SUPERACT 25 WG es un insecticida que actúa por contacto e ingestión sobre el sistema nervioso de los insectos.

Modo de preparación: Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	kg/200L de agua	kg/ha		
Páprika	"Mosca blanca"	<i>Bemisia tabaci</i>	0.07-0.1	0.175-0.25	3	0.5

*PC: Periodo de Carencia.

**LMR: Límite Máximo de Residuos.

Frecuencia y Epoca de Aplicación: Aplicar SUPERACT 25 WG (Thiamethoxam) máximo 2 aplicaciones por campaña, en presencia de la plaga luego de haber efectuado una evaluación del campo y considerando el umbral económico del cultivo.

Periodo de Reingreso: Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

Compatibilidad: El producto es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente usados.

Fitotoxicidad: En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectados respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

