

ANTAMETHYL® 500 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES – WG

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Kresoxim methyl 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es de cuidado. No ingerir, ni aspirar la aplicación. Utilice el equipo de protección durante la mezcla, manipulación, aplicación y para ingresar al ambiente de tratamiento en las primeras 24 horas. No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado, lejos de la casa. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes. No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Estrobilurinas
En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
En caso de ingestión, no provoque el vómito, si el paciente está inconsciente no dar de beber.
En contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante varios minutos.
En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático y de soporte.

CICOTOX: 080013040 / ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase, destrúyalo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para peces y organismos acuáticos.
No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. No enterrar los envases ni los desechos del producto en el suelo. No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el ambiente. En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ANTAMETHYL 500 WG es un fungicida del grupo de las estrobilurinas que inhibe la respiración mitocondrial del hongo, afectando directamente su metabolismo y su germinación para finalmente causar su muerte.

ANTAMETHYL 500 WG, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. Aplicar manteniendo el sistema de agitación constante.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/cil.	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Vid	Oídium	<i>Erysiphe necator</i>	0,060	35	1.0

PC: Período de carencia / LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se observen los primeros síntomas o se presenten condiciones ambientales propicias para el hongo.
No se debe realizar más de dos aplicaciones por campaña / año. El intervalo entre aplicaciones es de 12 a 15 días.
Dosis máxima por hectárea: 0,24 kg/ha
De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD

ANTAMETHYL 500 WG, es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



Antalien

Calidad para la Agricultura

Reg PQUA N°

Titular del registro: **ANTALIEN SAC**

Formulador:

NANJING ESSENCE FINE CHEMICAL Co., Ltd.
Piso 5, N° 18 Suove Road Nanjing 210017, P.R.China
Teléfono: 86 25 86455862 / 86455863

Contenido neto: **25 kg**

N° Lote

F. de form:

F. de venc:

Importado y distribuido por:

ANTALIEN SAC
Calle Arica Nro. 125 Of. 401 - Miraflores - Lima
Teléfono: 445-7352.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

