Medida: 29.7 cm x 21 cm
Actualizada: Ene. 2015
ML

PANTONE 2945 C

Azostar® 50 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Composición Química:

Azoxystrobin .....500 g/kg
Aditivos .....500 g/kg

Reg. PQUA Nº 479 - SENASA
Titular del registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
SHANDONG A&FINE AGROCHEMICALS CO., LTD.
Shandong Shouguang Economy Technology Development Zone, China
Teléfono: 0086 536 5100106

Importado y Distribuido por:
MONTANA S.A.
Av. Los Rosales 280
Santa Anita, Lima - Perú
Teléfono: (511) 4193000
E-mail: info@montana.com.pe

Contenido Neto: 25 kg.

Lote Nº:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

MONTANA
® Marca Registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico : Estrobilurina
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira brindarle respiración artificial.
- En caso de ingestión, solicitar atención médica inmediata. Si la persona puede beber, darle uno o dos vasos de agua. No dar de beber nada a la persona si se encuentra inconsciente.
- Nota al médico: No se conoce antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
- Después de usar el contenido de la bolsa destruya este envase y depósitelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes de producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AZOSTAR® 50 WG es un fungicida de amplio espectro para el control de diversas enfermedades. Presenta una acción sistémica en forma ascendente y movimiento translaminar. Está compuesto por azoxystrobin el cual inhibe la respiración del hongo a nivel mitocondrial interrumpiendo de esta manera la producción de energía. Sobre los hongos, **AZOSTAR® 50 WG** inhibe la germinación de las esporas, el desarrollo del tubo germinativo y el crecimiento inicial del micelio del hongo. Además presenta un fuerte efecto antiesporulante. **AZOSTAR® 50 WG** favorece una mejor asimilación de nitrógeno en la planta aumentando la capacidad fotosintética y retardando la senescencia del cultivo, esto da como resultado un mejor rendimiento al momento de cosecha.

Preparación de la Mezcla:
AZOSTAR® 50 WG se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

AZOSTAR® 50 WG puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo del hongo.
- Se recomienda como máximo realizar tres (3) aplicaciones de **AZOSTAR® 50 WG** por campaña. Para ello puede aplicar **AZOSTAR® 50 WG** dos veces de manera consecutiva para luego rotar con otro fungicida de diferente grupo químico.

PERÍODO DE REINGRESO
Reingrese al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
AZOSTAR® 50 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común e incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina. Se recomienda antes de efectuar la mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

FITOTOXICIDAD
AZOSTAR® 50 WG no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/ha	g/200L		
Pimiento, páprika y ají	Oidiosis	*Leveillula taurica*	0.20 - 0.24	80	3	2
Vid	Oidiosis	*Erysiphe necator*	0.2	40	14	2
Cebolla	Mancha púrpura	*Stemphylium vesicarium*	0.25 - 0.30	100	2	10
Alcachofa	Oidiosis	*Leveillula taurica*	0.20 - 0.24	80	7	5
Espárrago	Mancha púrpura	*Stemphylium vesicarium*	0.20 - 0.25	80 a 100	N.D.	0.05

PC: Periodo de carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos