MEDIDAS: 14CM X 15.8CM
ENE.2015
ML

TIRA

Paczol

REGULADOR DE CRECIMIENTO

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Paclobutrazol ..... 250 g/L
Aditivos ..... csp 1 L

Reg. PQUA N° xxx – SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
MONTANA S.A.
Av. Los Rosales 280 Santa. Anita. Lima -Perú.
Teléfono: (511) 419-3000
e-mail: infor@montana.com.pe

Formulado por:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
12/F Lucky Building 39 Wellington - Street
Central HK. China.

Contenido Neto: 5L
Lote Nº
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

PANTONE 2945 C

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

MEDIDAS: 14CM X 15.8CM
ENE.2015
ML

RETIRA

PANTONE 2945 C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es de cuidado, NO INGERIR.
- Causa moderada irritación a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: no administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente. Enjuagar la boca con abundante agua limpia.
- En caso del contacto con los ojos: lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos como mínimo.
- En caso del contacto con la piel: quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón por espacio de 15 minutos.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
MONTANA: 419-3000
ESSALUD: 117 o 0801-10200
CICOTOX: 0-800-1-3040
CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depósitelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin y evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- **PACZOL** es un regulador de crecimiento sistémico cuyo modo de acción se traduce en la inhibición de la síntesis de giberelinas, lo que produce una disminución del crecimiento vegetal desviando los nutrientes asimilados (fotosintatos) hacia una mayor producción y crecimiento de frutos. Aumenta la cantidad de yemas florales e induce una proporción mayor de ramilletes florales en la parte inferior del árbol, incrementando la cantidad de frutos cuajados.
- **PACZOL** favorece la formación de un árbol más pequeño y más fácil de manejar, mejorando la penetración de la luz. Reduce el largo de los entrenudos y la producción de brotes laterales, disminuyendo los requerimientos de poda. Esto se manifiesta en una mejor conformación del árbol con un follaje más equilibrado, mejor calidad de frutos y uniformidad en su tamaño.
- **PACZOL** se aplica en aspersión previa mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre como pulverizadores manuales o accionados por tractor que se encuentren en buen estado y debidamente calibrados.
- Usar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una buena cobertura tanto del follaje como de las panículas florales.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	USOS	DOSIS (%)	DOSIS L/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
"Palto" *Persea americana*	Controla el crecimiento vegetativo. Favorece el cuajado y crecimiento de frutos	0.6 – 1 % (2 aplicaciones de 0.3 – 0.5 %)	1.5-2.5	60	0.5

PC: Periodo de Carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Se recomienda dos (02) aplicaciones fraccionadas por campaña por año. La primera, cuando el palto se encuentre en floración al 70% y con presencia de brotes vegetativos de 3 a 4 cm, la segunda aplicación, en formación del fruto cuando tenga aproximadamente un diámetro de 0.5 cm o presencia de nuevos brotes vegetativos.
- Los árboles que se tratan con **PACZOL** deben estar sanos y vigorosos. Se recomienda utilizar en los frutales manejados en forma intensiva y se debe usar en combinación con las buenas prácticas agrícolas.

PERÍODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
PACZOL es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, sin embargo cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa o consultar a nuestro Departamento Técnico. Evitar su mezcla con materiales oxidantes y alcalinos.

FITOTOXICIDAD
PACZOL no es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.