

A diagram of a rectangular prism. The front face is a rectangle with a width of 19 cm, indicated by a dimension line below it. The prism is shown in a perspective view, with the top and right faces also visible. The top face is a rectangle, and the right face is a rectangle. The edges are drawn in black, and the faces are shaded in light gray.

8.5 cm

A diagram of a rectangular box. The height of the box is labeled as 19 cm.

A diagram of a trapezoid with a vertical line segment indicating its height is 8.5 cm.

23 cm

FINESSE

50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE - WG

Composición:
Emamectin benzoato 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

TITULAR DEL REGISTRO : CROP BUSINESS S.A.C
Reg. PQUA N° 1139 - SENASA
Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS SAC



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina
Teléfono: 349-2669

F. de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 Kg
F. de Vencimiento:

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
West Tower, Fortune International Building
N° 359 Hongwu Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO
NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si se inhalaba, evite respirar polvo y aspersión.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo toxicológico: Avermequinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos lávuelos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.

Nota al médico: El producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC: 349-2669
 ESSALUD: 117 (gratuito) CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FINESSE 50 WG es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad sistémica utilizada para control de larvas de lepidópteros y otros mirípodos de hojas.

FINESSE 50 WG actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-arvicida.

Finesse 50 WG se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **FINESSE 50 WG** cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

Aplicar **FINESSE 50 WG** (i.e. Emamectin benzoato) hasta tres aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando 2 campañas por año para los cultivos de espárrago y pimiento.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

COMPATIBILIDAD

FINESSE 50 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

FITOTOXICIDAD

FINESSE 50 WG no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (%)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Espárrago	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2 -	30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2 -	7	0.02
Mai	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15 -	7	0.01
Tomate	Oruga minadora de hojas y tallos	<i>Tuta absoluta</i>	0.15 -	7	0.02
Arándano	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.09	7

P.C.: Período de carencia (días)
L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/ha/Kg/200L		
Espárrago	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	- 30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	- 7	0.02
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	- 7	0.01
Tomate	Oruga minadora de hojas y tallos	<i>Tuta absoluta</i>	0.15	- 7	0.02
Arándano	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.09	7. 0.01

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO