

19 cm

8.5 cm

# FINESSE 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

GRANULO DISPERSABLE - WG

**Composición:**

Emamectin benzoato ..... 50 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

TITULAR DEL REGISTRO : CROP BUSINESS S.A.C  
Reg. PQUA N° 1139 - SENASA

Importado y Distribuido por:



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 402 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 370-7251

F. de Formulación: Formulado por:  
N° de Lote: SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO.,LTD  
Nro. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road  
Contenido Neto: 1 Kg Song Jiang District, Shanghai  
F. de Vencimiento: CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

19 cm

8.5 cm

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
  - Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión.
  - Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
  - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
  - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Utilice la ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
  - No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
  - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Avermectinas
  - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
  - En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
  - En caso de contacto con los ojos lávalos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
  - En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:  
CROP BUSINESS SAC: 349-2669  
CICOTOX: 8800-1-3040

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos adyacentes.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades para tal fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

FINESSE 50 WG es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad traslaminar utilizado para control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas.

FINESSE 50 WG actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicida.

FINESSE 50 WG se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Iniciar la aplicación de FINESSE 50 WG cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

Aplicar FINESSE 50 WG (i.e. Emamectin benzoato) hasta tres aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando 2 campañas por año para los cultivos de espárrago y pimiento.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

**COMPATIBILIDAD**

FINESSE 50 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

**FITOTOXICIDAD**

FINESSE 50 WG no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/ha/Kg/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Técnico				
Espárrago	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	-	30	0.01
	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	-	7	0.02
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	-	7	0.01
Tomate	Oruga minadora de hojas y tallos	<i>Tuta absoluta</i>	0.15	-	7	0.02
Arándano	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.09	7	0.01
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	-	0.07	3	0.01

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

