

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE, TRANSPORTE.

Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños.

- No fumar, comer ni beber durante la mezcla y aplicación de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y bañarse
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.

NOTA AL MEDICO

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

- DL 50 ORAL>5000 mg/Kg
- DL 50 DERMAL>2000 mg/Kg

No Explosivo No Inflamable No Corrosivo

NOTA AL COMPRADOR

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

NANSIL (POLIOXYN B)

POLVO MOJABLE (WP)

Composición :

Polioxyn B.....100 gr/Kg
Aditivos.....c.s.p 1 Kg

FUNGICIDA BIOLOGICO DE USO AGRICOLA

Reg. PBUA N° 328 - SENASA

Titular del Registro: TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.

Separadora Industrial Mz “E” lote 12
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima
Teléfono: 348-1103 FAX: 348-102



Importador y Distribuidor:

Formulador: Shaanxi Suger Road Bio-Science CO., LTD. Chuangye Avenue # 9, Jixian Industrial Park, Zhouzhi Country, Xi, An, Shaanxi, China.

Contenido Neto: 1 Kg
Lote Nro.
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

INDICATIVOS DE USO

NANSIL es un fungicida biológico con acción principalmente de contacto. Utilice NANSIL como tratamiento preventivo.

SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACIÓN

Para aplicar este producto se requiere premezcla, se vacía directamente en el tanque de mezcla definitiva. Debe dispersarse en todo el agua sin que haya asentamientos, por ello es necesario agitar. Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

Aplicar NANSIL cuando aparezcan las primeras infestaciones de la plaga.

CUADRO DE DOSIFICACION

Cultivo	Nombre de la plaga		Dosis Kg/Ha	UAC* (Días)	LMR* (p.pm)
	N. Común	N. Científico			
Vid	Oidium	Uncinula necator	1.00	ND	ND

*U.A.C: Última aplicación antes de la cosecha en días.

*L.M.R: Límite Máximo de Residuos.

COMPATIBILIDAD

No pre mezclar NANSIL con otro componentes antes de añadir al tanque de aplicación si no se conoce previamente su compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas, a excepción de los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni en los frutos en que se recomienda si se emplea la dosis indicada.

“Manténgase alejado de las personas, animales , productos alimenticios y medicinales”



LIGERAMENTE TOXICO PRECAUCION

“Destruya este envase inmediatamente después de usar el producto”.



