

30.5 CMS.

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- DK-LONIL es un fungicida de formulación Suspensión Concentrada. Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:
- Es moderadamente irritante a los ojos, causa daño temporal a los ojos.
 - Es ligeramente irritante a la piel. Cuidado, evite el contacto, posiblemente carcinogénico.
 - Tóxico por ingestión.
 - No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Después de usar el producto déjelo, lave la ropa contaminada y lávese con abundante agua y jabón.
 - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. No trabajar en la neblina del líquido asperjado.
 - No aplicar por mujeres embarazadas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico organofosforado.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. En caso de ingestión haga beber 1 o 2 vasos de agua, provoque el vómito y llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos láveselos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos y obtenga ayuda médica y si el contacto fue con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de Emergencias llamar a: CICOTEX Telf: 0690-43840 o ESSALUD Telf: 423-7690.
- NOTAL MEDICO: Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Reciclar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- PELIGROSO para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estuarios o muelles, con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o subproductos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir el ingreso de animales domésticos en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlarla deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

DK-LONIL®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Chlorothalonil 720 g/L
 Adyuvante c.s.d. 1 L

Reg. PQUA N° 164 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERU S.A.
 J. Mariscal La Mar N° 901 piso 8
 Magdalena del Mar, Lima - Perú
 Teléfono: 501-1000 - FAX: 262-8403

FORMULADO POR:

KINGTAL CHEMICALS CO LTD.
 3F-Huazhong Times Mansion Hi-Tech
 Development Zone, Binjiang Hangzhou-China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERU S.A.

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

Número de Lote :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DK-LONIL es un fungicida foliar protectante no sistémico, a base de Chlorothalonil que actúa por inhibición de los procesos de respiración celular del hongo.

DK-LONIL se emplea en aplicaciones diluidas necesitando cobertura completa del follaje para garantizar el control de la enfermedad.

Para garantizar uniformidad en la mezcla, coloque la cantidad de DK-LONIL a aplicar en el cilindro con la mitad del volumen de agua y agite, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla.

Agite este envase antes de abrirlo y utilizarlo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS ml/200 L	PC Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Cercosporiosis	Cercospora asporagi	300 - 400	7	0.1
Cebolla	Alternariosis	Alternaria porri	500 - 600	7	0.5
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	500 - 750	14	0.2
Alcachofa	Moho Gris	Botrytis cinerea	500 - 600	1	0.01

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Ensayo y cebolla: Se recomienda realizar una aplicación por campaña como máximo a dos aplicaciones al año en caso de dos campañas para el cultivo de espárrago. Aplicar en forma preventiva (cuando las condiciones ambientales son favorables al desarrollo de la enfermedad), cuando el cultivo muestre infecciones iniciales.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

DK-LONIL es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con las de reacción alcalina o fuertemente alcalina. No mezclar con aceites de uso agrícola.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



30.5 CMS.

DK-LONIL®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Chlorothalonil 720 g/l
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA Nº 164 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERU S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991 piso 9
Magdalena del Mar, Lima - Perú
Teléfono: 501-1000 - FAX: 262-8403

FORMULADO POR:

KINGTAI CHEMICALS CO LTD.
9F: Huarong Times Mansion Hi-Tech
Development Zone, Binjiang Hangzhou-China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERU S.A.

CONTENIDO NETO: 4 Litros

Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :
Número de Lote :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- DK-LONIL® es un fungicida foliar protectante no sistémico, a base de Chlorothalonil que actúa por inhibición de los procesos de respiración celular del hongo.
- DK-LONIL® se emplea en aplicaciones diluidas necesitando cobertura completa del follaje para garantizar el control de la enfermedad.
- Para garantizar uniformidad en la mezcla, coloque la cantidad de DK-LONIL® a aplicar en el cilindro con la mitad del volumen de agua y agite, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla.
- Agite este envase antes de abrirlo y utilizarlo.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. No trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No aplicar por mujeres embarazadas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico organoclorado.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. En caso de ingestión haga beber 1 o 2 vasos de agua, provoque el vómito y llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos y obtener ayuda médica y si el contacto fue con la piel, lávese con abundante agua y jabón.
- En caso de Emergencias llamar a: CICOTOX. Telf.: 0800-13040 o ESSALUD. Telf.: 423-7600.
- NOTA AL MÉDICO: Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- PELIGROSO para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir el ingreso de animales domésticos en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DK-LONIL® es un fungicida foliar protectante no sistémico, a base de Chlorothalonil que actúa por inhibición de los procesos de respiración celular del hongo.

DK-LONIL® se emplea en aplicaciones diluidas necesitando cobertura completa del follaje para garantizar el control de la enfermedad.

Para garantizar uniformidad en la mezcla, coloque la cantidad de DK-LONIL® a aplicar en el cilindro con la mitad del volumen de agua y agite, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla.

Agite este envase antes de abrirlo y utilizarlo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS ml / 200 L	P.C. Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Carcinoma	Cercospora asparagi	300 - 400	7	0.1
Cebolla	Alternariosis	Alternaria porri	500 - 600	7	0.5
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	500 - 750	14	0.2
Alcachofa	Moho Gris	Botrytis chereae	500 - 600	1	0.01

LMR: Límite máximo de residuos

P.C. Período de curación

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Espárrago y cebolla: Se recomienda realizar una aplicación por campaña como máximo p dos aplicaciones al año en caso de dos campañas para el cultivo de espárrago. Aplicar en forma preventiva (cuando las condiciones ambientales sean favorables al desarrollo de la enfermedad), cuando el cultivo muestre infecciones iniciales.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

DK-LONIL® es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina. No mezclar con aceites de uso agrícola.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la información que aparece en el etiquetado y que el uso que se haga de él, de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



00 008

DK-LONIL®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Chlorothalonil 720 g/l
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 164 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERU S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9
Magdalena del Mar, Lima - Perú
Tel.: 501-1000

FORMULADO POR:

KINGTAL CHEMICALS CO. LTD.
8F-Huangong Times Mansion HI-Tech
Development Zone Binjiang Hangzhou-China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERU S.A.

CONTENIDO NETO: 200 Litros

Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :
Número de Lote :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- DK-LONIL® es un fungicida de formulación Suspensión Concentrada. Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:
- Es moderadamente irritante a los ojos, causa daño temporal a los ojos.
- Es ligeramente irritante a la piel. Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. No trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No aplicar por mujeres embarazadas.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico organoclorado.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. En caso de ingestión haga beber 1 o 2 vasos de agua, provoque el vómito y llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos y obtener ayuda médica y si el contacto fue con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de Emergencias llamar a: CICOTOX Tel.: 0800-139040 o ESSALUD Tel.: 423-7600.
- NOTAR AL MÉDICO: Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo y depositado en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- PELIGROSO para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 15 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir el ingreso de animales domésticos en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DK-LONIL® es un fungicida foliar protectante no sistémico, a base de Clorotalonil que actúa por inhibición de los procesos de respiración celular del hongo.

DK-LONIL® se emplea en aplicaciones diluidas necesitando cobertura completa del follaje para garantizar el control de la enfermedad.

Para garantizar uniformidad en la mezcla, coloque la cantidad de DK-LONIL® a aplicar en el cilindro con la mitad del volumen de agua y agite, complete luego el volumen de agua requerido mientras continúa agitando la mezcla.

Agite este envase antes de abrirlo y utilizarlo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS ml / 200 L	PC Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	300 - 400	7	0.1
Cebolla	Alternariosis	<i>Alternaria porri</i>	500 - 600	7	0.5
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	500 - 750	14	0.2
Alcachofa	Moho Gris	<i>Botrytis cinerea</i>	500 - 600	1	0.01

L.M.R. Límite máximo de residuos

P.C. Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Espárrago y cebolla. Se recomienda realizar una aplicación por campaña como máximo o dos aplicaciones en caso de campaña en el cultivo de espárrago. Aplicar en forma preventiva cuando las condiciones ambientales son favorables al desarrollo de la enfermedad, cuando el cultivo muestre infecciones iniciales.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

DK-LONIL® es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina. No mezclar con aceites de uso agrícola.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO