

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Es ligeramente irritante para los ojos la piel y el aparato respiratorio.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- No utilizar el envase para almacenar alimentos o agua.
- No comer, beber ó fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico - Benzoylureas
- Síntomas de intoxicación: puede causar irritación al sistema respiratorio. Riesgo de irritación ocular. Los vapores podrían causar somnolencia y desvanecimiento.
- NO INDUCIR AL VOMITO, en caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- Antídoto: No existe antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.

TELÉFONOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 24 HORAS AL DÍA:

Toxicológicas:
CICOTOX 0-800-1-3040 (GRATUITO)
ALO ESSALUD: 0801-10200

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración. Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques y arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación ó sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe cumplir con todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio mucho menos en los ríos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- No reenvasos o depositar el contenido en otro envase.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conservar alimentos o agua potable



INGRO® 50 EC

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION QUIMICA:

Lufenuron..... 50 g/L
Aditivos..... csp 1L

Registro Nacional PQUA N° 483-SENASA
Titular del Registro: **Rotam Agrochemical Perú S.A.**
Av. Arenales 395, Of. 603 - Lima 1

Formulado por:



JIANGSU ROTAM CHIMESTRY CO. LTD.
88 Rotam Road, ETDZ
Kunshan, Jiangsu.
Tel. 051257711988
Fax: 051257718697
CHINA

Importador y Distribuidor:



AGRITOP SAC
Av. Los Gorriones 130
Urbanización La Campaña
Chorrillos, Lima - Perú
Tel. (511) 719-1717
Fax. (511) 719-1718
www.agritop.net

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

INGRO® 50 EC es un insecticida regulador de crecimiento que actúa inhibiendo la síntesis de quitina en el exoesqueleto del insecto.

INGRO®50 EC puede ser aplicado en equipos aspersores auto-propulsados y/o acoplados a tractor, y también del tipo de espalda. Llenar el recipiente del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen y agregar la dosis de **INGRO®50 EC**, agitar vigorosamente y completar el volumen a aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Tomate	"Gusano ejército"	<i>Spodoptera ochrea</i>	0.45 - 0.50	1 día	0.05
Espárrago	"Gusano de tierra"	<i>Copitarsia decolora</i>	0.20 - 0.25	14	0.02

P.C.: Período de carencia
LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña / año. Aplicar el producto a los primeros indicios de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas."

