

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Es ligeramente irritante para los ojos la piel y el aparato respiratorio.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajés.
- No utilizar el envase para almacenar alimentos ó agua.
- No comer, beber ó fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico - Benzoylurea
- Síntomas de intoxicación: puede causar irritación al sistema respiratorio. Riesgo de irritación ocular. Los vapores podrían causar somnolencia y desvanecimiento.
- **NO INDUCIR AL VÓMITO**, en caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- Antídoto: No existe antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800-13040
ESSALUD: 0-800-10-828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas ú otros artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración. Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques y arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación ó sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe cumplir con todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilízelo triturándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio mucho menos en los ríos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otro envase.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conservar alimentos ó agua potable.



INGRO® 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Lufenuron: 50 g/L
Aditivos: c.s.p. 1 L

Registro Nacional PQUA No. 483-SENASA
Titular del Registro: Rotam Agrochemical Perú S.A.
Calle Los Tulipanes 147, Of. 304 - Surco
Lima - Perú

Formulado por:



JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
N° 88 Rotam Road, ETZDZ, Kunshan,
Jiangsu 215301 China.
www.rotam.com

Importado y Distribuido por:



GREEN SOLUTIONS S.A.C.
Jr. Aurelio Miró Quesada 512
Urb. Ingeniería
Lima 31 – Perú
www.greensolutions.pe

CONTENIDO NETO: 1 L

No. de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

INGRO® 50 EC es un insecticida regulador de crecimiento que actúa inhibiendo la síntesis de quitina en el exoesqueleto del insecto.
INGRO® 50 EC puede ser aplicado en equipos aspersores autopropulsados y/o acoplados a tractor, y también del tipo de espalda. Llenar el recipiente del equipo de aspersión hasta la mitad de su volumen y agregar la dosis de **INGRO® 50 EC**, agitar vigorosamente y completar el volumen a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Tomate	“Gusano ejército”	<i>Spodoptera ochrea</i>	0.45 - 0.50	1 día	0.05
Espárrago	“Gusano de Sierra”	<i>Copitarsia decolora</i>	0.20 - 0.25	14	0.02

P.C: Periodo de carencia.
LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña / año. Aplicar el producto a los primeros indicios de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas”.

