

# Oficial

## 500 WG

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**Composición:**

Azoxystrobin.....500 g/Kg  
Aditivos .....c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 1172-SENASA

Titular de Registro: **POINT ANDINA S.A.**



Calle Loreto, Mz A6, lote 15  
Urbanización Santa Patricia II Etapa.  
La Molina. Lima- Perú  
Tel: 348 -1018 / 349 - 9609.

Formulado por: **POINT AGRO-CHINA LIMITED.**



Wan Shi Town,  
Yixing, Jiangsu, 214217 China  
Tel. (86-510) 8785 1001, Fax. 8785 1537

Importado y distribuido por:  
**Softagro**  
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

**SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.**

Av. Guillermo Dansey 2176  
Lima Cercado - Perú.  
Tel. (01) 3368645  
Fax. (01) 3368299

Contenido neto: 250 g  
Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo o la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela copia de esta etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la operación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Estrobilurinas
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto, quítese la ropa y lave la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

**TELÉFONO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:**  
CICOTOX: 0800-1-304 ; ESSALUD 117, 411-800 ;  
POINT ANDINA 3481018/ 3499609

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y organismos acuáticos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**INSTRUCCIONES DEL USO Y MANEJO**

•OFICIAL 500 WG es un fungicida sistémico del grupo de las estrobilurinas que actúa inhibiendo la respiración mitocondrial del hongo, su germinación y finalmente causa su muerte.

•OFICIAL 500 WG se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia de pH 5 a 7. Aplicar en plantas en capacidad de campo. No aplicar en plantas estresadas o enfermas.

•OFICIAL 500 WG puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor).

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar tan pronto se observen los síntomas de la enfermedad
- En vid realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Con un intervalo entre 7-14 días, de acuerdo a la presión de la enfermedad y las condiciones ambientales.
- En pimiento máximo 1 aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año
- Máximo aplicar 0.2 Kg/Ha
- En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar a las 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

OFICIAL 500 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

OFICIAL 500 WG no es fitotóxico cuando se utiliza como es

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg / cil	Kg / Ha		
PIMIENTO	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.06	-	3	2.0
VID	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.1-0.2	14	2.0

LMR. Limite máximo de residuos    P.C. Periodo de Carencia

