

QUIMIZEB® 80 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Mancozeb 800 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. N° 427-97-AG-SENASA

Titular del Registro:



Formulado y Distribuido por:

SERFI S.A.

Av. República de Panamá 2577
La Victoria. Lima - Perú
Telef.: 710-4068

Fecha de Form.:

N° de Lote:

Contenido Neto: 1 Kg

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Guardar el producto bajo llave en un lugar fresco, seco y con buena ventilación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: **Ditiocarbamato**

- **En caso de intoxicación:** Llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- **En caso de contacto con los ojos:** Lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de ingestión:** Si el paciente ha ingerido gran cantidad del fungicida, y no ha ocurrido vómito, considerar el lavado gástrico. Puede usarse carbón activado o en mezcla con solución catártica (sorbitol).

Nota al Médico: QUIMIZEB® 80 WP no tiene antídoto específico. Todo tratamiento deberá ser sintomático.

Teléfonos de emergencia:

CETOX: 0800-71911

ESSALUD: 411-8000 (opción 4), **Infosalud:** 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación en el tanque, y luego in tilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar d stinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para éste fin.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/cil 200 L	kg/ha		
Papa	Hielo o Rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	7	0.2
	Tomate	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	7
Marigold	Mancha de hoja	<i>Alternaria spp.</i>	0.5	1.0 - 2.0	7	0.1
Ajo	Mildiu	<i>Penorospora destructor</i>	0.5	1.0 - 2.0	7	0.6
Apio	Alternariosis	<i>Alternaria spp.</i>	0.5	1.0 - 2.0	7	0.1
	Cercosporiosis	<i>Cercospora apii</i>	0.5	1.0 - 2.0	7	0.1
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.5 - 0.75	1.0 - 1.5	N.A	0.1
	Cercospora	<i>Cercospora asparagi</i>	0.5 - 0.75	1.0 - 1.5	N.A	0.1
Pimiento	Hielo o Rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	7	5.0

P.C.: Período de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

N.A.: No aplica

