

LUFEAGRIN 80

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

Composición química:

Lufenuron 800 g/kg
Aditivos csp 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del registro,
Importador y Distribuidor:
AGRINOR S.A.C.
Jr. Matier 305 of. 301
San Borja, Lima
Tel.: 637 8185

Formulado por:
Jiangsu Heye Agro-Chemical Co. Ltd
Chemical Concentration Area, Linhai
Townshio, Sheyang County,
Yancheng City, Jiangsu Province, China

Contenido Neto: **500g**

Lote :
F. Fab. :
F. Venc. :



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es de cuidado. No ingerir.

El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Benzoilurea.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de ingestión: No inducir el vómito ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

En caso de inhalación: Llevar al paciente a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario dar respiración artificial. Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar al CICOTOX tel.: 0800-1-3040
(atención 24 horas), ESSALUD tel.: 0801-10200 o
CISPROQUIM tel.: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el envase, perfore la bolsa para que no pueda ser reutilizada y colóquela en un contenedor. Proceda luego de acuerdo con la reglamentación vigente.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para contener la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

LUFEAGRIN 80 es un regulador del crecimiento, que actúa inhibiendo la síntesis de quitina como un agente anti-muda, causando la muerte de las larvas. Actúa específicamente sobre Lepidópteros y Coleópteros, principalmente por ingestión.

Es más activo contra larvas de los primeros estadios de desarrollo. Llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantidad de LUFEAGRIN 80 recomendada y finalmente completar el llenado del tanque con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS:

Cultivo	Plaga		Dosis kg/Ha	P.C. (días)	LMR (mg/kg)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0,10 - 0,15	7	0,02

P.C.: Período de carencia.

LMR.: Límite máximo de residuos en mg/kg

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar dos aplicaciones por campaña. Realizar el tratamiento cuando aparezca la plaga y cuando el nivel de daño económico lo justifique.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta después de 24 hs de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

No presenta problemas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No presenta problemas de fitotoxicidad en el cultivo a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendado s si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

