

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado y repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, lejos de la casa-habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Estrobilurinas + Triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y hoja informativa adjunta. No deje solo al intoxicado.
- Antídoto: No tiene antídoto específico.
- Nota al médico: Dar tratamiento sintomático y de soporte.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** CIPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800- 1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828; ESSALUD en línea: (01) 411-8000 anexo 4; ADAMA Agriculture Perú: (01) 641-0000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Trigold®

250 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Kresoxim methyl 125 g/L
Epoxiconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1179-SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Formulado por:
ADAMA Andina B.V.
Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Int Zona Franca
Barranquilla, Colombia.

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. El Derby N° 254 Of 503.
Santiago de Surco. Lima - Perú.
Teléfono: (01) 641-0000

Contenido neto: **500 ml**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Trigold 250 SC es un fungicida con acción preventiva y curativa que combina dos ingredientes activos con distintos mecanismos de acción. Aplicar al follaje con equipo de pulverización terrestre. Previo a la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en buenas condiciones de uso y correctamente calibrado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.8 - 1.0	35	0.05 ¹ 0.1 ²
Cebolla	Mancha foliar	<i>Stemphyllium vesicarium</i>	0.5 - 0.6	n.d.	0.05 ^{1,2}
Espárrago	Mancha foliar	<i>Stemphyllium vesicarium</i>	0.25 - 0.5	30	0.05 ^{1,2}

P.C.: Período de Carenia LMR : Límite Máximo de Residuos
n.d.: No determinado 1-Kresoxim methyl / 2-epoxiconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar la primera aplicación de forma preventiva cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del patógeno o se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Considerar hasta dos (02) campañas al año en los cultivos recomendados.

Cebolla: Aplicar entre 25 a 30 días después del trasplante hasta llenado del bulbo. Realiza máximo dos (02) aplicaciones por campaña.

Espárrago: Aplicar entre desarrollo vegetativo hasta maduración de brotes o floración. Realizar máximo una (01) aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Ver Hoja Informativa adjunta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones: 230 mm x 120 mm

Esta etiqueta requiere Hoja Informativa