

17 cm

13 cm

20.5 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE; FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es ardiente, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aerosol.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos medicinales, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para proteger al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinóide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático. En caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

CICOTOX: 0860-1-3040 (gratuito)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CISPROQUIM: 080-059-847 (gratisuto)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESHECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítalo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No permitir que fluyan de agua con los restos de la aplicación o sobrenantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

AVENGER 200 SP

es un insecticida sistémico de amplio espectro con actividad traslaminar que actúa por contacto e ingestión.

- AVENGER 200 SP es eficaz para el control de mosca blanca y querosas en diversos cultivos como pimiento y jabo.
- AVENGER 200 SP tiene efecto sobre los huecos, ninfas y adultos de insectos y puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas o plancas, a molar, tecomoras, parhuallas, etc.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- El momento de aplicación es cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga.
- Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependará de la interacción plaga-cultivo. Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña/año.
- Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

AVENGER 200 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina u oxidante.

FITOTOXICIDAD

AVENGER 200 SP no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomendara.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO."

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ^a		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg /200 L	kg /Ha		
PALTO	Querosa	<i>Floricola florivora</i>	0.1	0.5	21	0.01
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	0.3	7	0.3
CEBOLLA	Thrips		0.15 - 0.2	0.45 - 0.6	7	0.02
VID	Chinche harinoso	<i>Pseudococcocus viburni</i>	0.15 - 0.2	-	3	0.5
ARROZ	Ogarta de verde de la hoja blanca	[Tigraxoxe + D-Sigantose] oxinolone	0.1	-	7	0.01

P.C.: Período de Carenacia (días) LMR: Límite Máximo de Residuo (ppm: partes por millón)

COMPOSICION:

Acetamiprid _____	200 g/kg
Aditivos _____	c.s.p. 1 kg

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



CROP
BUSINESS S.A.C.
Asociación de Inversores

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 1 Kg
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:
NANJING FENGSHAN CHEMICAL CO. LTD.
1904, Central International Mansion 105-6
North Zhongshan Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"						
CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200 L	kg/Ha		
PALTO	Quenesa	<i>Fiorinia florinae</i>	0.1	0.5	21	0.01
PIMIENTO	Mosca Blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	0.3	7	0.3
CEBOLLA	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.15 - 0.2	0.45 - 0.6	7	0.02
VID	Chichine chinorosa	<i>Pseudococcocus viburni</i>	0.15 - 0.2	-	3	0.5
ARROZ	Ogranta del virus de la hoja blanca	<i>Topovirus (-Negativus) orizicola</i>	0.1	-	7	0.01

P.C.: Período de Carenzia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

