

23.00 centímetros

46.30 centímetros

14.80 centímetros

7.60 centímetros

7.60 centímetros

7.60 centímetros

38.00 centímetros

Versión 1

Auenger
200 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA
POLVO SOLUBLE (SP)

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Auenger
200 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA
POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid..... 200 g/kg
Aditivos c.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N° 613 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:
NANJING RHONQUIM CO., LTD.
N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009
CHINA

Importado y Distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 1 kg

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

Titular de Registro, importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión: No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- En caso de contacto con los ojos: Levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.



INSECTICIDA AGRÍCOLA
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
200 SP

Auenger
200 SP

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AVENGER 200 SP es un insecticida sistémico de amplio espectro con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión.
AVENGER 200 SP es eficaz para el control de mosca blanca, queresá y thrips en diversos cultivos como pimiento, palto y cebolla respectivamente.
AVENGER 200 SP tiene efecto sobre los huevos, ninfas y adultos de insectos y puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochilas a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (p.p.m.)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha		
PALTO	Queresá	<i>Fiorinia florinae</i>	0.1	0.5	21	0.01
PIMENTO	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	0.3	7	0.3
CEBOLLA	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.15 - 0.2	0.45 - 0.60	7	0.02
VID	Chinche harinoso	<i>Pseudococcus viburni</i>	0.15 - 0.2	-	3	0.5
ARROZ	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus</i>	0.1	-	7	0.01

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- El momento de aplicación es cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga.
- Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña/año.
- Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERÍODO DE REINGRESO

Puede reingresar sin equipo de protección 24 horas después de la aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

AVENGER 200 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellos de reacción fuertemente alcalina u oxidante.

FITOTOXICIDAD

AVENGER 200 SP no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Auenger
200 SP