

**Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm**  
**Actualizado: Agosto 2014**  
**ML**

**PANTONE 485 C**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire la aspersión.
- Puede causar quemadura a la piel y daño irreversible a los ojos. Evite el contacto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y la aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa - habitación.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- No permita el ingreso de personas y animales al área tratada con este producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: organofosfatos
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta. No dé solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Administrar atropina
- Indicaciones para el médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte. Este producto inhibe la actividad de la colinesterasa, en ningún caso se debe administrar morfina.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**MONTANA: 419-3000**  
**ESSALUD: 0801-10200**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración ni en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar la retención del Ethoprophos, a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**NEMACAP**

**NEMATICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Ethoprophos..... 400 g/L  
 Solvesso 150 ..... 550 g/L  
 Aditivos..... csp 1 L

**Reg. PQUA N° xxx – SENASA**  
 Titular de Registro: **MONTANA S.A.**

**Formulado por:**

OASIS AGROSCIENCE LIMITED  
 12/F Lucky Building 39 Wellington Street  
 Central HK, China.

**Importado y Distribuido por:**

**MONTANA**  
 Av. Los Rosales 280 Santa Anita.  
 Lima -Perú.  
 Teléfono: (511) 419-3000  
 e-mail: info@montana.com.pe

**Contenido Neto: 1 L**

Lote N°:  
 Fecha de Form.:  
 Fecha de Venc.:



**CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**



**NO EXPLOSIVO**

**ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **NEMACAP** es un nematocida perteneciente al grupo de los órgano-fosfatos.
- **NEMACAP** presenta una acción rápida y actúa afectando la eclosión de huevos, migración y dispersión de nematodos. Controla estados juveniles y adultos de vida libre y formas móviles de nematodos endoparásitos.
- **NEMACAP** se aplica en drench sobre el suelo que está cubriendo la zona radicular del cultivo. Para ello, se realiza una pre-mezcla en un volumen reducido de agua agitando hasta homogenizar la mezcla y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación completando el volumen requerido. Aplicar sólo con equipos montados al tractor o a través del sistema de riego por goteo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)*			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis	1ª aplicación	2ª aplicación		
Granado	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	15 a 18	8 10	7 8	90	0.02
Vid	Nematodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	18	10	8	80	0.02

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos,  
 \* Dosis aplicadas en dos fracciones con un intervalo de 30 días.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Granado: La dosis indicada en el cuadro de usos fraccionada en 2 aplicaciones cada 30 días durante la etapa de brotamiento o crecimiento radicular (al inicio de las primeras infestaciones de nematodos), previa evaluación del nivel de daño en el cultivo.
- Vid: La dosis indicada en el cuadro de usos fraccionada en 2 aplicaciones cada 30 días durante el periodo de crecimiento de raíces.
- Aplicar una dosis fraccionada en 2 aplicaciones por campaña por año.

**PERÍODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**NEMACAP** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar.

**FITOTOXICIDAD**

**NEMACAP** no es fitotóxico usado a la dosis y sobre el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

