

Medidas: 26 cm x 13.5 cm
Actualizado: Mayo 2015
ML

PANTONE 485 C

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y
LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico por ingestión. No ingerir.
- Puede ser letal si es inhalado. No respire la aspersión.
- Puede causar quemadura a la piel y daño irreversible a los ojos. Evite el contacto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y la aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa - habitación.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- No permita el ingreso de personas y animales al área tratada con este producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: organofosfatos
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrele la etiqueta. No deje solo al intoxicado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión: Si el paciente está inconsciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Administrar atropina
- Indicaciones para el médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte. Este producto inhibe la actividad de la colinesterasa, en ningún caso se debe administrar morfina.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

MONTANA: 419-3000
ESSALUD: 0801-10200
CICOTOX: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración ni en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar la retención del Ethoprophos, a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



NEMACAP

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ethoprophos..... 400 g/L
Solvelso 150 550 g/L
Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N° 1184 - SENASA

Titular de Registro: MONTANA S.A.

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Formulado por:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED
12/F Lucky Building 39 Wellington Street
Central HK. China.

Importado y Distribuido por:

MONTANA S.A.
Av. Los Rosales 280 Santa Anita.
Lima -Perú.
Teléfono: (511) 419-3000
e-mail: info@corpmontana.com

Contenido Neto: 20 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE



NO EXPLOSIVO



ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- NEMACAP es un nematocida perteneciente al grupo de los órgano-fosfatos.
- NEMACAP presenta una acción rápida y actúa afectando la eclosión de huevos, migración y dispersión de nematodos. Controla estados juveniles y adultos de vida libre y formas móviles de nematodos endoparásitos.
- NEMACAP se aplica en drench sobre el suelo que está cubriendo la zona radicular del cultivo. Para ello, se realiza una pre-mezcla en un volumen reducido de agua agitando hasta homogenizar la mezcla y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación completando el volumen requerido. Aplicar sólo con equipos montados al tractor o a través del sistema de riego por goteo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ha)*			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis	1ª aplicación	2ª aplicación		
Granado	Nematodo del nudo	Meloidogyne incognita	15 a 18	8 10	7 8	90	0.02
Vid	Nematodo del nudo	Meloidogyne incognita	18	10	8	80	0.02

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

* Dosis aplicadas en dos fracciones con un intervalo de 30 días.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Granado: La dosis indicada en el cuadro de usos fraccionada en 2 aplicaciones cada 30 días durante la etapa de brotamiento o crecimiento radicular (al inicio de las primeras infestaciones de nematodos), previa evaluación del nivel de daño en el cultivo.
- Vid: La dosis indicada en el cuadro de usos fraccionada en 2 aplicaciones cada 30 días durante el periodo de crecimiento de raíces.
- Aplicar una dosis fraccionada en 2 aplicaciones por campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

NEMACAP es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, sin embargo se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar.

FITOTOXICIDAD

NEMACAP no es fitotóxico usado a la dosis y sobre el cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.