Longitud Total 28.9 cm.

Altura Total 13.5 cm.

" LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Ligeramente peligroso si es inhalado.
- Ligeramente peligroso si es ingerido.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente con llave sombreado, seco y ventilado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazol.
- En caso de inhalación. Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial. Si es necesario llevar al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavar la piel, con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. Consultar al médico en caso de irritación.
- En caso de ingestión accidental: llevar al médico inmediatamente. Dar a beber abundante agua. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o por un doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia: SAMU: 106.
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01) 641-0000.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

SETTING®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

REGULADOR DE CRECIMIENTO

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN:

Paclobutrazol..... 250 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 1180-SENASA

Titular del Registro:
ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.
Av. EL Derby 254. Int 306. Santiago de Surco. Lima-Perú.
Telf.: (01) 641-0000

Importador y Distribuidor:
AgroKlinge
A member of ADAMA
Agro Klinge S.A.
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.
Telf: (01) 641-0000

Formulador:
BETA CHEMICALS
Rm.707, Blk. A, Kingsound Center,
No. 116 Zizhuyuan Road,
Beijing 100097, China

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

NO CORROSVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua aplicar, empezar agitar y simultáneamente echar la cantidad de **SETTING**, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

SETTING, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	USO	DOSIS L/Ha	PC (Días)	LMR
PALTO	Durante la floración y etapa de crecimiento de la fruta.	4	120	0.5

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **SETTING** como máximo 2 aplicaciones por campaña, siendo una campaña por año y a un intervalo de 15 días entre aplicación, durante la etapa de floración y crecimiento de la fruta.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

® Marca registrada

UI:150519 V2

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

Longitud Literal 27 cm.

09 cm

Longitud de Color 28 cm.