

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

 Ingrediente activo: Dimethomorph...... 500 g/kg • Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1185 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar. Lima - Perú. Telf.: 501-1000



FORMULADO POR:

Ningbo Yihwei Chemicals Co., Ltd. 11-A Haihua Plaza, No. 658 North Jianguo Road, Hangzhou 310004, Zhejiang, P.R. China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 kg

Número de Lote Fecha de Formulación Fecha de Vencimiento

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polyo, vapor o aspersión.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, hebidas ni forraies
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Morpholine
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, enjuague la boca inmediatamente. No dar nada por vía oral a una persona inconsciente. No inducir al vómito a menos
- n caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón. Si se desarrolla irritación, busque atención médica.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerlo en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua, por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagando.
- · Teléfonos de emergencia: SAMU Telf.: 106; DROKASA PERÚ S.A Telf.: (01) 501-1000; CETOX: 0800-71911.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruva el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL

- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de aqua de al
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

JIRKA, es un fungicida que pertenece al grupo químico de las morfolinas, actúa impidiendo la formación de pared celular de hongos oomicetos como la rancha y el mildiú.

JIRKA tiene acción translaminar (pasa de un lado a otro de las hojas) y sistémica hacia las partes superiores de la planta

En un recipiente previo prepare una pre-mezcla con agua y un fungicida acompañante. Llene el tanque o cilindro de aplicación hasta la mitad de la capacidad y agregue la premezcla, v por último llene el tanque agitando

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palança, estacionarios o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

JIRKA, es utilizado en forma preventiva cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o cuando se advierte los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación/campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

JIRKA, es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de usar en campo definitivo.

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		РС	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	Kg/200L	días	(mg/kg)
Papa	"Hielo o Rancha"	Phytophthora infestans	0.36 - 0.40	-	7	0.5
Vid	"Mildiú"	Plasmopara viticola	-	0.20	12	3

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

















