

CROMIN

75% WP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Ciromazina 750 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 096 -SENASA

Titular de Registro:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, Piso 9
Magdalena del Mar, Lima-Perú
Teléfono: 501-1000

Formulado:

SUNDAT (S) PTE LTD.
26 Gul Crescent Singapore 629532.

Importado y Distribuido por:

DROKASA PERÚ S.A

Fecha de formulación:

Número de lote:

Contenido neto: 100 g (bolsa hidrosoluble)

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora y equipos de protección personal durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Moderadamente tóxico por inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al Médico: en caso de ingestión, dar de beber agua con carbón medicinal.
- No hay antídoto específico, tratar de forma sintomática.
- En caso de Emergencias llamar a:
CICOTOX Telf: 0800 - 13040
ESSALUD Telf: 423 - 7600

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de utilizar el contenido, destruya este envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.

- No aplicar en suelos con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- CROMIN 75% WP** es un insecticida sistémico regulador de crecimiento que actúa por contacto e ingestión, interfiriendo en el desarrollo normal de los estados inmaduros (muda y empupamiento) de los insectos.
- CROMIN 75% WP** está especialmente recomendado para el control de mosca minadora en cultivos hortícolas.
- CROMIN 75% WP** se emplea diluido en agua; preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada directamente al tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
- CROMIN 75% WP** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras o pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor) que se encuentre en buen estado de funcionamiento y correctamente calibrado. Iniciar las aplicaciones luego de un previo monitoreo del cultivo, aplicar de manera uniforme. Se recomienda que el diámetro de la boquilla sea mayor de 50 µm con ello se mitigaría el riesgo por inhalación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Puede variar de acuerdo a la incidencia del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- El producto se debe aplicar una vez por campaña o máximo 2 veces por año.
- No repetir la aplicación antes de 7 - 14 días.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

CROMIN 75% WP no es compatible con los productos de reacción alcalina como arseniato de plomo, aceite mineral, etc.

FITOTOXICIDAD:

CROMIN 75% WP no es fitotóxico a los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/200 L	g/ha	
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70 - 100	140 - 200	21
					0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC.: Período de carencia

