

“ LEA TOTALMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO ”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazol.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelé la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencias llamar a:

CIPROSQUIM: 0800-5-0847. ESSALUD EN LÍNEA: 107 ó 0801-10200
FITOCORP: 6522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, tritúrandolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FREEBAK

FUNGICIDA AGRICOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

COMPOSICION QUIMICA

Difenoconazole250g/L

Aditivos c.s.p 1L

Registro PQUA No. -SENASA

Titular, Importador y Distribuidor:

AGROKLINGE S.A

Separadora Industrial Mz "E" lote 12
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima
Teléfono: 348-1103 FAX: 348-102



Formulado y fabricado por:

Hangzhou Udragon Chemical Co., LTD.

No.172, Zhangjiadun Road, Tangxi Development Zone, Hangzhou City
Zhejiang Province, China.

Contenido neto: 1 Lt.

Lote N°:

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

RECOMENDACIONES DE USO

FREEBAK es un fungicida sistémico de acción translaminar. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol de la membrana celular, lo que conlleva a la muerte del hongo.

FREEBAK se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a las dosis indicada con la mitad de volumen de agua utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de las aplicación. Calibrar el equipo previamente.

El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo. No aplicar en campos con problemas de humedad o bajo estrés.

CONSULTE CON UN ING. AGRONOMO

CUADRO DE USOS

Cultivo	Nombre de la plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/cil	L/Ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	0.30	7	0.5

P.C: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar cuando se detecte los primeros inicios de la enfermedad.

Dirigir las aplicaciones hacia los brotes.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. La segunda aplicación previa evaluación.

En caso se requiera una tercera aplicación, usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas para ingresar al campo tratado

COMPATIBILIDAD

FREEBAK es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con ácidos y bases fuertes (pH <2 o pH >11).

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis, y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

