

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA DE INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Neonicotinoide.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- **Antídoto:** No existe antídoto específico.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX : 0800-13-040 (línea gratuita)  
 CROP BUSINESS SAC : 349-2669 ESSALUD: 147 (línea gratuita)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para las abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- **IMIDACROP PLUS 700 WP** es un insecticida sistémico con actividad translaminar, que actúa por contacto e ingestión.
- **IMIDACROP PLUS 700 WP** es un insecticida de amplio espectro, utilizado para el control de insectos succionadores en diversos cultivos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Iniciar la aplicación de **IMIDACROP PLUS 700 WP** cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga.

- Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las primeras 12 horas.

**COMPATIBILIDAD**

**IMIDACROP PLUS 700 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina, acida u oxidante.

**FITOTOXICIDAD**

El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg /200 L	kg/Ha		
TOMATE	“Mosca blanca”	<i>Bemisia tabaci</i>	0.06	0.18	7	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos

P.C.: Periodo de Carenia



# IMIDACROP PLUS 700 WP

## INSECTICIDA AGRICOLA

### POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICION QUÍMICA:**

Imidacloprid \_\_\_\_\_ 700 g/kg  
 Aditivos \_\_\_\_\_ c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N°**

Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:  
 CROP BUSINESS S.A.C.



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización  
 Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA  
 Teléfono: 349-2669

N° Lote :  
 F. de Form.:  
 F. de Venc.:

Formulado por:  
 NANJING FENGSHAN CHEMICAL CO., LTD.  
 1904, Central International Mansion 105-6  
 North Zhongshan Road, Nanjing  
 CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**Contenido neto: 100 g.**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**