

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvos, vapor o aspersión.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. Mantener al afectado tranquilo y en un lugar protegido de la luz. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- Antídoto: No existe antídoto específico
- Nota al médico: Tratamiento sintomático y de soporte.

TÉLFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX : 0800-13-040 (línea gratuita)
CROP BUSINESS SAC : 349-2669 ESSALUD: 117 (línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **IMIDACROP PLUS 700 WP** es un insecticida sistémico con actividad translaminar, que actúa por contacto e ingestión.

- **IMIDACROP PLUS 700 WP** es un insecticida de amplio espectro, utilizado para el control de insectos succionadores en diversos cultivos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar la aplicación de **IMIDACROP PLUS 700 WP** cuando se observen los primeros indicios del ataque de la plaga.

- Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las primeras 12 horas.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200 L	kg/Ha		
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.06	0.18	7	0.5
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifila</i>	0.05	-	3	1.0
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus</i>	0.035	-	30	1.5

P.C.: Periodo de Carenia (días)

LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: Partes por millón)



IMIDACROP PLUS 700 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid 700 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 1193 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS SAC



Calle Toledo N° 161 Dpto 201 Urb. Mayorazgo IV Etapa - ATE

Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 250 g.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NANJING FENGSHAN CHEMICAL CO., LTD.

1904, Central International Mansion 105-6

North Zhongshan Road, Nanjing

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**