

ETIQ. ULTRAPYR SC X 1L

28.7x14.5 cm



1cm  
Sin UV

1cm  
Sin UV

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, la aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.
- No utilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Pirroles
- En caso de contacto con los ojos mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos continuamente con agua corriente durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retire inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel y el cabello con agua corriente. Continúe enjuagando con agua durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, mueva a la persona hacia el aire fresco.
- Si la persona no está respirando, brindar respiración artificial, lleve al paciente al médico o al hospital inmediatamente y muéstrele la etiqueta y hoja informativa del producto.
- En caso de ingestión: NO inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.

**Antídoto:** No existen antídotos específicos, dar tratamiento según sintomatología

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# ULTRAPYR

**PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada (SC)**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Chlorfenapyr.....240 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA N° 1236 - SENASA**

**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**  
**FARMAGRO S.A.**

Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)  
Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.  
Central: (01) 614 1500



MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**Formulador:**

**LION AGREVO (JIANGSU) CO., LTD.**  
N°16, Second Halbin Road, Chemical Industrial Park, Yangkou Coastal Economic Development Zone, Rudong Country, Jiangsu, China.

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**ULTRAPYR**, es un insecticida/acaricida a base de chlorfenapyr usado para el control de una amplia gama de plagas de diversos cultivos. Actúa rápidamente por ingestión aunque también lo hace algunas veces por contacto. Posee buena acción translaminar con limitada acción ovicida.

**ULTRAPYR**, se emplea diluido en agua, se prepara cargando el tanque con agua hasta un tercio de su capacidad, luego se agrega la dosis recomendada del producto y se completa el volumen de agua de aplicación.

**ULTRAPYR**, puede ser aplicado con cualquier equipo de aplicación terrestre. Antes de la aplicación asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y calibrado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS	P.C días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE COMÚN	L/ha		
Tomate	“Caballada”	<i>Spodoptera eridania</i>	0.25-0.30	14	0.05

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar una sola aplicación por campaña, durante los primeros 30 días después del transplante. Aplicar al inicio de la detección de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingrese a las áreas tratadas durante 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común pero se debe evitar el contacto con ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características física- químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

