

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión induzca al vómito, administrar dos cucharadas de carbon activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.
- Teléfonos de Emergencia:  
CICOTOX: 0800-13040 ó 328-7398 (gratuito) / ESSALUD: 117 (gratuito)  
CISPROQUIM: 0801-050-847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantenga a los animales fuera de las zonas tratadas al menos durante 7 días después de la aplicación.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas altas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# SATISFAR® 25% EW

## FUNGICIDA AGRICOLA

### Emulsión aceite en agua – EW

#### Composición química:

Tebuconazole.....250 g/L  
Aditivos.....c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1090 - SENASA

#### Titular del registro:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS  
Calle 21 N°713 Oficina 205 San Isidro Lima - Perú  
Teléfono: (01) 225 5951

#### Formulado por:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD  
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750  
Jinan, Shandong, China  
+86-531-88875230

#### Importado y distribuido por:



*Instituto Peruano del Espárrago  
y Hortalizas*

Contenido Neto: 1 L

N° Lote:

F. de Form:

F. de Venc:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada por IPEH

#### INDICACIONES DE USO

**SATISFAR 25% EW** es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa en el control de la "roya" en el cultivo del espárrago. **SATISFAR 25% EW** se emplea en pulverizaciones foliares, en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre. Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, es decir la desmetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo.

#### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

**SATISFAR 25% EW** se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad con agua.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS Y DOSIS

| Cultivo   | Plaga        |                          | Dosis | P.C.<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|--------------|--------------------------|-------|----------------|--------------|
|           | Nombre común | Nombre científico        | L/ha  |                |              |
| Espárrago | Roya         | <i>Puccinia asparagi</i> | 0.625 | 30             | 0.02         |

**PC:** Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña por año, con un intervalo de 15 días. La aplicación se realizará en presencia de los primeros síntomas de la enfermedad.

#### PERIODO DE REINGRESO

24 horas después de aplicado el producto.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

#### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.
- En caso de ingestión induzca al vómito, administrar dos cucharadas de carbon activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.
- Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático. Antídoto: No tiene antídoto específico.
- Teléfonos de Emergencia:  
CICOTOX: 0800-13040 ó 328-7398 (gratuito) / ESSALUD: 117 (gratuito)  
CISPROQUIM: 0801-050-847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantenga a los animales fuera de las zonas tratadas al menos durante 7 días después de la aplicación.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas altas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# SATISFAR® 25% EW

## FUNGICIDA AGRICOLA

**Emulsión aceite en agua – EW**

**Composición química:**

Tebuconazole.....250 g/L  
Aditivos.....c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1090 - SENASA

**Titular del registro:**

INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS  
Calle 21 N°713 Oficina 205 San Isidro Lima - Perú  
Teléfono: (01) 225 5951

**Formulado por:**

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD  
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750  
Jinan, Shandong, China  
+86-531-88875230

**Importado y distribuido por:**



*Instituto Peruano del Espárrago  
y Hortalizas*

**Contenido Neto: 20 L**

N° Lote:

F. de Form:

F. de Venc:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

© Marca registrada por IPEH

**INDICACIONES DE USO**

**SATISFAR 25% EW** es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa en el control de la “roya” en el cultivo del espárrago. **SATISFAR 25% EW** se emplea en pulverizaciones foliares, en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre. Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, es decir la desmetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA**

**SATISFAR 25% EW** se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad con agua.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

| Cultivo   | Plaga        |                          | Dosis | P.C.<br>(Días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|--------------|--------------------------|-------|----------------|--------------|
|           | Nombre común | Nombre científico        | L/ha  |                |              |
| Espárrago | Roya         | <i>Puccinia asparagi</i> | 0.625 | 30             | 0.02         |

**PC:** Período de carencia / **LMR:** Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN**

Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña por año, con un intervalo de 15 días. La aplicación se realizará en presencia de los primeros síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

