

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es tóxico si se ingiere. Evite contacto directo
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Los envases una vez usados, se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión induzca al vómito, si la persona esta consciente administrar dos cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.
- En caso de contacto cutáneo, remover la ropa contaminada, lavar con agua y jabón la zona afectada.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua por lo menos 15 minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), manteniendo los párpados abiertos para enjuagar, después consultar a un médico.

- **NOTA AL MEDICO:** El tratamiento es sintomático. No existe ANTIDOTO específico.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: Telf.: 08001 3040 Atención las 24 horas IPEH: Telf.:(01) 2255951

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.



BLIZZARD® 25% EC

FUNGICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable – EC

Composición:

Difenoconazole 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 1201 SENASA

Titular del Registro:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS



Formulado por:

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION

Dirección: 15 Hubu Street, Nanjing, Jiangsu, P.R. CHINA

Teléfono: 86-25-86895000

Importado y distribuido por:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS

Dirección: Calle 21 N° 713 Oficina 205 San Isidro Lima - Perú

Teléfono: (01) 2255951

www.ipeh.org.pe

F. de Form:

N° Lote:

Contenido Neto: 20 L

F. de Venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

® Marca registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BLIZZARD® es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa en el control de la "roya" en el cultivo del espárrago. **BLIZZARD®** se emplean en pulverizaciones foliares, en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

BLIZZARD® actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol se decir la dimetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo.

Preparación y aplicación

BLIZZARD 25% EC se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con equipo de aspersión manual o a motor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	L/200L		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.5	-	7	0.05
	Mancha del Peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.4-0.5	-	-	-
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.15-0.18	7	3.00

L.M.R.= Límite máximo de residuos en partes por millón / **P.C.** = Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Efectuar un máximo de dos aplicaciones por año, con un intervalo de 10 a 14 días y cuando se observa los primeros síntomas de la enfermedad.

Vid: Realizar dos aplicaciones foliares por campaña al año, durante el desarrollo de hojas, a intervalos de 14-21 días cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad. Máximo 1.05 L/ha.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con productos de las mismas características, en caso de duda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



<... 20.0 cm ...>