neoagrum asegura tu cosecha	ETIQUETA KIETO 150 WG - SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED	Revisión: 00 Aprobado: JR Fecha: 31-07-2018 Página: 4 de 4

21.0 cm

16.5 cm

2.5 cm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar **KIETO® 150 WG** como máximo 2 veces por año.
Iniciar las aplicaciones al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo. Rotar con plaguicidas de diferentes grupos químicos.

COMPATIBILIDAD:
KIETO® 150 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
KIETO® 150 WG no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

EFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS:
No tienen efectos sobre otros cultivos.

EFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS:
No se han reportado efectos sobre cultivos sucesivos.

MÉTODO DE APLICACIÓN:
Aspersión dirigida al follaje de las plantas tratadas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:
Mochila de espalda, las que se calibran determinando el gasto de agua en un área definida. Del mismo modo se procede en otros equipos de aplicación.

PERIODO DE REENTRADA:
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido el periodo, deberá usar equipo de protección.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CUADRO DE USOS: **"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R. (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Científico	g / 200L	(días)	Emamectin	Lufenuron
Alcachofa	Gusano perforador	*Heliothis virescens*	100-150	14	0.1	0.1
Arándano	Gusano Perforador	*Heliothis virescens*	100	14	0.01	0.02
Col	Polilla del dorso de diamante	*Plutella xylostella*	100	7	0.01	0.2
Espárrago	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	100	14	0.01	0.02
Maíz	Gusano cogollero	*Spodoptera frugiperda*	100	10	0.01	0.05
	Langosta migratoria	*Schistocerca piceifrons*	100-150	10	0.01	0.05
Palto	Gusano del cesto	*Oiketicus kirbyi*	100	30	0.01	0.02
Pimiento	Gusano perforador	*Heliothis virescens*	100	7	0.02	1
Tomate	Oruga minadora	*Tuta absoluta*	100	7	0.1	0.1
Vid	Gusano Ejercito	*Spodoptera eridania*	100	7	0.05	1

P.C.: Periodo de carencia (días). L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón).

KIETO® 150 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:
Emamectin benzoate..... 50 g/kg
Lufenuron..... 100 g/kg
Aditivos..... c.s.p.1kg

Reg. PQUA N° 1203 - SENASA
Titular del Registro: NEOAGRUM S.A.C.

Nombre común (ISO) : Emamectin benzoate
Nombre químico (IUPAC) : Emamectin B1A benzoate
Fórmula estructural :



Fórmula empírica : $C_{56}H_{81}NO_{15}$ (emamectin B1b benzoate)
Peso molecular : 1008.3 + 994.2 g/mol
Grupo químico : Neonicotinoide

Nombre común (ISO) : Lufenuron
Nombre químico (IUPAC) : (RS)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy) phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
Fórmula estructural :



Fórmula empírica :
Peso molecular : 511.16 g/mol
Grupo químico : Neoicotinoide

Importado y Distribuido por:
neoagrum
Pje. Camino de Acceso N°02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Formulado por:
SINO CROP SCIENCE CORP LTD
29 Xiaohang Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD
- **LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**
- **"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bánese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y semillas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo Químico: Avermectin + Benzoylurea.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de emergencia llamar a:

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 28 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES Y EQUIPOS DE APLICACIÓN:
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores, en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligrosos para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En el caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
KIETO® 150 WG se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:
KIETO® 150 WG es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos, emamectin benzoate (insecticida no sistémico, translaminar) y lufenuron (insecticida sistémico de ingestión con acción residual y mayor actividad en la larva durante los primeros estadíos).

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

LOGO PRODUCTO
LOGO NEOAGRUM
PANT. 343 **PANT. 377** **PANT. 1375**

TEXTO **B.TOXICOLOGICA**
NEGRO **PANT. YELLOW C**

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE