

# KIETO®

## 150 WG

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULO DISPERSABLE - WG**

**COMPOSICIÓN:**

Emamectin benzoate..... 50 g/kg  
 Lufenuron..... 100 g/kg  
 Aditivos..... c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
**NEOAGRUM S.A.C.**

Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima  
 Teléfono: 617-6400



**Contenido neto: 25 kg**

N° de Lote:  
 F. de Form.:  
 F. de Venc.:

Formulado por:  
 SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED  
 29 Xiaohang Road, Nanjing  
 CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y semillas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Avermectin + Benzoylurea
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrigada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de contacto con los ojos, levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.
- En caso de emergencia llamar a:

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
 CICOTOX: 0-800-1-3040 o (01)328-7398  
 ESSALUD: 0801-10200  
 CISPQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido destruya este envase y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas o polinizadores, en el cultivo a tratar o en cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**KIETO® 150 WG** es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos, emamectin benzoate (insecticida no sistémico, tránslaminar) y lufenuron (insecticida sistémico de ingestión con acción residual y mayor actividad en la larva durante los primeros estadios). **KIETO® 150 WG** se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomás, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Aplicar **KIETO® 150 WG** como máximo 2 veces por campaña por año. Iniciar las aplicaciones al observar los primeros indicios de la plaga en el cultivo. Rotar con plaguicidas de diferentes grupos químicos.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Ingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**

**KIETO® 150 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**

**KIETO® 150 WG** no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg / ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)	
	Nombre Común	Nombre Científico			Emamectin	Lufenuron
Espárrago	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15 - 0.20	14	0.01	0.02

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

