

15 cm

CLEANSPRAY

HERBICIDA AGRICOLA

Gránulos solubles - SG

Composición Química:

2,4-D sal amina 800 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC

Av. El Polo 670 Oficina C-402

Santiago de Surco, Lima 33, Perú

Teléfono: 713 9960

rainbowchem@rainbowchem.com

www.rainbowchem.com



FABRICANTE Y FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.

6th Floor, Gaoxinjisshuchuangye Centre Shunhua Road 750#, Jinan

Shandong- China 250101

Teléfono: 86-531-88875222

Fax: 86-531-88875232

Contenido Neto: 250 g

Lote N°:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Reg. PQUA N° - SENASA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

25 cm

25 cm

15 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Guardar bajo llave, en lugares frescos secos y con buena ventilación.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos, bebidas u otros productos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Alkylchlorophenoxy**
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua durante 15 minutos y cambiarse la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación, conducirlo al médico.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. Proporcionar tratamiento sintomático.
- En caso de EMERGENCIA llamar a: **CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas), ESSALUD EN LINEA: 411-8000 (Opción 4)**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de aplicación.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Incorporar materia orgánica a los suelos para mejorar la retención del 2,4-D a fin de reducir su movilidad y minimizar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CLEANSPRAY es un herbicida selectivo y tóxico a malezas de hoja ancha que actúa inhibiendo su crecimiento.

Para la preparación de la mezcla y aplicación considerar lo siguiente:

- Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
- La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
- La absorción de **CLEANSPRAY** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar aplicaciones post-emergentes, cuando las plantas tengan de 20-30 cm de altura. Realizar una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al campo tratado después de transcurridas 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo y a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Maleza		Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha		
Maiz	“Hierba mora”	<i>Solanum nigrum</i>	2.0	14	0.05
	“Verdolaga”	<i>Portulaca oleracea</i>			
	“Cerraja”	<i>Sonchus oleraceus</i>			

PC: Periodo de carencia L.M.R: Limite máximo de residuos

