

MILSTOP®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:

Mancozeb..... 600 g/Kg
Dimethomorph.....90 g/Kg
Aditivos..... c.s.p 1 Kg

Registro PQUA N° 1199- SENASA



Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

Tecnología Química y Comercio S.A.

Calle René Descartes N° 311

Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.

Telf.: 612-6565,

R.U.C N° 20307150981

Formulador:

KINYIELD INDUSTRY CO. LIMITED.

Dirección: Unit 905 Workingberg Commercial

Building 41-47 Marble road.

Hong Kong. China.

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 Kg

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

30 cm

22 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminado.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AXILIOS:

- Grupo químico: Ditiocarbamato+Morfolina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

NOTA EL MÉDICO:

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia:

SAMU: 106
TQC S.A.: (01) 6126565

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del presente envase inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces, no contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MILSTOP, es un fungicida de acción preventiva y curativa, que se recomienda para el cultivo de papa en el control de "huelo" o "rancha".

Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, agitar y simultáneamente echar la cantidad de **MILSTOP** a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente complementar la cantidad de agua.

MILSTOP, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.

Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación, así como el ritmo de aplicación del aplicador.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedad		Dosis	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg/Ha		
Papa	"Rancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	2.5	7	0.2 (1) 0.05(2)

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Periodo de carencia.

1) Mancozeb
2) Dimethomorph

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar **MILSTOP** cuando se detecte los primeros inicios de la enfermedad. Dirigir las aplicaciones hacia los brotes. Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña. La segunda aplicación previa evaluación. En caso se requiera una tercera aplicación usar otro plaguicida de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al área tratada, después, de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de plaguicidas; sin embargo, es conveniente antes de realizar cualquier mezcla, efectuar pruebas de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

© Marca Registrada

