

“ LEA CUIDADAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Tóxico por ingestión.
- Peligroso por inhalación, irritante, al tacto y vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratoria.
- Moderadamente irritante a los ojos, causa daños a los ojos, use protección ocular.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañase con abundante agua y jabón.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y en la sombra.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase vacío puede utilizarse para almacenar alimentos ni bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo Químico: Estrobilurina.
- En caso de intoxicación por ingestión o inhalación, llamar inmediatamente al médico o llevar al paciente al médico y llevar la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 20 minutos y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Consultar al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático, no existe antídoto específico.
-

TELEFONO DE EMERGENCIA
CICOTOX telf.: 0800-1-3040(Atención 24 horas).
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4.
FITOCORP: (01) 652-21813

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades para tal fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques, arroyos, con los restos de la aplicación, sobrantes o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

QUIOXY 50 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables WG

COMPOSICION QUIMICA

Azoxystrobin 500 g/Kg

Aditivos..... c.s.p 1 Kg

Registro PQUA N° - SENASA

Titular, Importador y Distribuidor:

FITOCORP SAC

Calle Los Tejedores 187. Vulcano. Ate

Teléfono: 016522182

Formulador:

BETA CHEMICALS LTD.

Rm.707, Blk. A, Kingsound Center, No. 116 Zizhuyuan Road,

Beijing 100097, China



Contenido Neto: 250 gramos

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar QUIOXY 50 WG es un fungicida que actúa inhibiendo la producción y germinación de las esporas y el crecimiento del micelio del hongo. Para la preparación de QUIOXY 50 WG, llenar hasta la mitad con agua del recipiente de mezcla, verter la dosis recomendada y comenzar agitar hasta tener una mezcla homogénea.
- Asegurarse la aplicación con un volumen de agua que cubra la superficie de la planta. Tomar en cuenta que su equipo de aplicación se encuentre en buenas condiciones.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USOS

Cultivos	Plagas		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre Científico	Kg/ Ha	gr/Cil (200 L)		
Pimiento, páprika y ají.	Oídiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.2-0.24	80	3	2
Vid	Oídiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.2	40	14	2
Cebolla	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.25-0.30	100	2	10
Alcachofa	Oídiosis	<i>Leveillula taurica</i>	0.20-0.24	80	7	5
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20-0.25	80 a 100	N.D	0.05

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Para una mayor eficiencia, debe ser aplicado de manera preventiva y la observación de los primeros síntomas de la enfermedad, puede ser aplicado hasta 2 veces por campaña, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

- QUIOXY 50 WG es compatible con la mayoría de los plaguicidas usados, sin embargo, se recomienda efectuar una prueba antes de la mezcla definitiva.

FITOTOXICIDAD

- QUIOXY 50 WG no es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

