

Glifolaq® 36 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN:

Glyphosate Isopropylamine Salt 480 g/l
Aditivos 640 g/l

PQA N° 501 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

AGRIPAC PERÚ SAC

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663

FORMULADOR:

AGRIPAC S.A.

Kilómetro 5.5 vía Durán - Tambo. Durán - Ecuador
PBX: 593-42808262 FAX: 593-42807279

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

AGRIPAC PERÚ SAC

Av. José Pardo 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663:

Contenido Neto: 4 Litros

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de Vencimiento:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia llamar al 3287398 CICOTOX - INFOSALUD 0800-10-828.

Nota al médico:

Glifolaq® 36 SL no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado, depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- Glifolaq® 36 SL es un herbicida post-emergente de acción sistémica no selectivo para el control de malezas anuales y perennes.
- Agite bien el envase antes de usar el producto.
- Evite que la aspersión moje las paredes del cultivo.
- Se emplea diluido en agua empleándose la proporción indicada en el cuadro de uso.
- No guardar la mezcla preparada para usarlo en días posteriores.

"CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Malezas		DOSIS Lt / cil	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Caña de azúcar	"Rabo de zorro"	Setaria verticillata			2.0
	"Coquito"	Cyperus rotundus			
	"Gramíneo"	Panicum purpurascens			
Arroz	"Moco de pavo"	Echinochloa crusgalli	2 - 3 Lt/cil	NP	0.5
	"Botoncillo"	Echinochloa crusgalli			
	"Gramíneo"	Echinochloa crusgalli			
Mandarina	"Gramíneo"	Cynodon dactylon			0.5
	"Lechera"	Euphorbia spp.			
	"Verdolaga"	Portulaca oleracea			
Vid	"Rabo de zorro"	Setaria verticillata			0.5
	"Chamico"	Datura stramonium			
	"Cadillo"	Cenchrus echinatus			
Espárrago	"Pala de gallina"	Echinochloa crusgalli			0.5
	"Amor seco"	Bidens pilosa			
	"Capulí cimarrón"	Nicotiana glauca			

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

N.P.: No procede, es un herbicida que no se aplica sobre los cultivos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: La frecuencia depende del cultivo y del manejo de riesgo. Se aplica en plena época de mayor actividad fisiológica de las malezas.

PERÍODO DE REENTRADA (REINGRESO): 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con herbicidas residuales como ureas sustituidas, triazinas u otros herbicidas de tipo hormonal, como bipiridilos, fenoxis, organoarsénicos, etc.

FITOTOXICIDAD: No se ha observado fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se emplean las medidas agronómicas adecuadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

