

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE  
USO AGRICOLA

Concentrado Soluble - SL

Composición

Ácido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidroxi-3-  
metil-6-metilen-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b,3-  
propeno[1,2-b]furano-4-carboxílico (Ácido Giberélico, GA<sub>3</sub>).... 68.9 g/L  
Aditivos c.s.p. .... 1 L



Reg. PBUA N° 155 – SENASA

Titular del Registro: Stoller Perú S.A.

Formulado por: Stoller Enterprises, Inc.

9090 Katy Freeway, Suite 400

Houston, Texas 77055,

Estados Unidos de Norteamérica

Importado y Distribuido por: Stoller Perú S.A.

Av. Michael Faraday N° 671, Mz. N, Lt 20,

Urb. Industrial Santa Rosa, Ate, Lima 03

Telef. 326-0180 • 326-3296 • 326-3180

e-mail: ventas@stoller.com.pe


www.stoller.pe

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

#### Información sobre el Producto

- Nombre químico (IUPAC): Ácido Giberélico (GA<sub>3</sub>).
- Ácido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidroxi-3-metil-6-metilen-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propeno[1,2-b]furano-4-carboxílico (Ácido Giberélico, AG<sub>3</sub>).
- Fórmula estructural:

Ácido Giberélico



- Formula Empírica: C<sub>19</sub>H<sub>22</sub>O<sub>6</sub>
- Peso Molecular: 346
- Propiedades Físico Químicas: Líquido, sin color a ligeramente amarillento cristalino, con característico olor a alcohol. pH = 7.4 en solución al 10 %. Densidad = 1.1 g/L Punto de estallido > 67°C, Temperatura de autoignición > 400°C.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

##### Instrucciones relativas a la seguridad

- Ningún envase que haya contenido N-LARGE Premier 6.26 % debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.

- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No almacenar en casas de habitación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, overol de dos piezas, botas de goma, careta de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No debe transportarse con alimentos de consumo humano o animal.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar en envase original, bajo sombra, en lugar fresco, seco y ventilado, fuera de la exposición directa al sol.

##### Instrucciones para almacenamiento

Conservar los envases herméticamente cerrados. El almacén debe ubicarse lejos de los alimentos, comida y prendas de vestir en ambientes secos por encima y debajo de los 38°C, fuera del alcance de la luz directa. Conservar fuera del alcance de los niños.

##### Primeros Auxilios

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja Informativa.
- En caso de contaminación de la piel y los ojos, lave inmediatamente las partes afectadas con abundante agua.
- No dar de beber nada ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

No tiene antídoto, tratar sintomáticamente.  
Teléfono de atención de emergencias toxicológicas: CICOTOX 0800-1-3040, STOLLER PERÚ S.A. 326-0180.

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para el ganado.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

## PRECAUCIÓN



36 cm

9 cm

9 cm

9 cm

9 cm

Consulte con Ingeniero Agrónomo

#### Cuadro de Dosificaciones

| Cultivo      |                             | Dosis                  |               | Momento de aplicación                                                                                                                      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|--------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Nombre común | Nombre científico           | (%)                    | mL/200 L agua |                                                                                                                                            |              |              |
| Papa         | <i>Solanum tuberosum</i> L. | 0.00625<br>a<br>0.0250 | 12.5 a 50     | Para estimular el brotamiento y romper de dormancia o latencia del tubérculo-semilla, antes de la siembra<br>Realizar una sola aplicación. | N.A.         | N.A.         |

| Cultivo      |                           | Dosis        |         |                  | Momento de aplicación                                                                                                                                                        | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|--------------|---------------------------|--------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Nombre común | Nombre científico         | g<br>i.a./Ha | ppm     | mL/200 L<br>agua |                                                                                                                                                                              |              |              |
| Alcachofa    | <i>Cynara scolymus</i> L. | 2 a 4        | 10 a 20 | 32 a 64          | Para promover la inducción de capítulos florales. Aplicar vía foliar aproximadamente a los 85 días después del trasplante, repitiendo la aplicación a los 15 días más tarde. | 7            | N.A.         |

| Cultivo      |                          | Dosis        |         |                 | Momento de aplicación                                                                                                                                             | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|--------------|--------------------------|--------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Nombre común | Nombre científico        | g<br>i.a./Ha | ppm     | L/Ha            |                                                                                                                                                                   |              |              |
| Vid          | <i>Vitis vinifera</i> L. | 12 a 70      | 6 a 35  | 0.19 a 1.14     | Para elongamiento del raquis de la inflorescencia. Aplicar foliarmente cuando el raquis tenga de 7 a 9 cm de longitud.                                            | 7            | N.A.         |
| Vid          | <i>Vitis vinifera</i> L. | 12 a 70      | 6 a 35  | 0.19 a 1.14     | Para raleo del racimo. Aplicar foliarmente al 40% de rajadura de caliptras.                                                                                       | 7            | N.A.         |
| Vid          | <i>Vitis vinifera</i> L. | 120 a<br>300 | 60 a 75 | 1.92 a<br>4.795 | Para crecimiento de la baya. Aplicar en inmersión de racimo, cuando las bayas tengan de 4 a 6 mm de calibre, repitiendo la aplicación a los 8 a 10 mm de calibre. | 7            | N.A.         |

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

N.A.: No Aplica.



36 cm

9 cm

9 cm

9 cm

9 cm

Hoja Informativa para envases de 25mL, 250mL y 1 L.

9 cm

10.5 cm

9 cm

10.5 cm