

Etiqueta para envase de 5 L.

**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiqueta y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, overol de dos piezas, botas de goma, careta de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido **N-LARGE Premier 6.26%** debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No almacenar en casa habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar en envase original, bajo sombra, en lugar fresco, seco y ventilado, fuera de la exposición directa al sol.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No tiene antídoto, tratar sintomáticamente.
- Teléfono de atención de emergencias toxicológicas: CICOTOX 0800-1-3040, STOLLER PERÚ S.A. 326-0180.

Nota al médico: DL<sub>50</sub> aguda oral = 4,090 mg/Kg DL<sub>50</sub> aguda dermal = 2,000 mg/Kg

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en el tanque de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



Lote N°:  
Fecha de Fab.:  
Fecha de Venc.:

# N-LARGE PREMIER 6.26%

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA**

**Concentrado Soluble - SL**

**Composición**

Ácido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidroxi-3-metil-6-metilen-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propeno[1,2-b]furano-4-carboxílico (Ácido Giberélico, GA3)..... 68.9 gr/L  
Aditivos c.s.p. 1L..... 1,031.1 gr/L

**Reg. PBUA Nº 155 – SENASA**

**Titular del Registro:** Stoller Perú S.A.  
**Formulado por:** Stoller Enterprises, Inc.  
4001 W Sam Houston Pkwy N, Suite 100  
Houston, Texas 77043,  
Estados Unidos de Norteamérica.

**Importado y Distribuido por:** Stoller Perú S.A.  
Av. Michael Faraday Nº 671, Mz. N, Lt 20,  
Urb. Industrial Santa Rosa, Ate, Lima 03.  
Telef. 326-0180 • 326-3296 • 326-3180  
e-mail: ventas@stoller.com.pe  
www.stoller.pe

**Contenido Neto: 5 L**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**Instrucciones de uso y manejo**

- Agite antes de usar.
- N-LARGE Premier 6.26%** puede aplicarse en el recipiente de mezcla con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes foliares, debiendo de ser agregado en el siguiente orden:  
1. AGUA 2. FERTILIZANTE FOLIAR  
3. **N-LARGE Premier 6.26 %** 4. PLAGUICIDA
- N-LARGE Premier 6.26%** puede aplicarse vía foliar y en tratamiento de semilla.
- N-LARGE Premier 6.26 %** se aplica preparando una solución a las dosis indicadas en el cuadro de dosificaciones.
- Para tratamiento de inmersión del tubérculo semilla, preparar la solución de remojo aplicando la dosis dada en el cuadro de dosificación. Sumergir la semilla durante 10 a 20 minutos.
- Tratamiento vía foliar: Aplicar en solución concentrada o diluida en suficiente volumen de agua para asegurar el mojado completo de la planta. Para el caso de vid es importante el mojado de racimos y bayas.
- Para aplicación de la solución vía foliar se puede emplear mochila de mano o de motor, motobomba o avión.
- El equipo de aplicación debe estar en perfectas condiciones. Para calibrar el equipo realizar una prueba en blanco determinando el volumen de agua gastado en la aplicación.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 7 días después de la aplicación.

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

Cultivo		Dosis			Momento de aplicación	UAC (días)	LMR (ppm)
Nombre común	Nombre científico	(%)	mL/200 L agua				
Papa	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0.00625% a 0.0250%	12.5 a 50		Para estimular el brotamiento y romper la dormancia o latencia del tubérculo-semilla, antes de la siembra. Realizar una sola aplicación.	N/A	N/A
Cultivo		Dosis			Momento de aplicación	UAC (días)	LMR (ppm)
Nombre común	Nombre científico	g i.a./Ha	ppm	mL/200 L agua			
Alcachofa	<i>Cynara scolymus</i> L.	2 a 4	10 a 20	32 a 64	Para promover la inducción de capítulos florales. Aplicar vía foliar aproximadamente a los 85 días después del trasplante, repitiendo la aplicación a los 15 días más tarde.	7	N/A
Cultivo		Dosis			Momento de aplicación	UAC (días)	LMR (ppm)
Nombre común	Nombre científico	g i.a./Ha	ppm	L/Ha			
Vid	<i>Vitis vinifera</i> L.	12 a 70	6 a 35	0.19 a 1.14	Para elongamiento del raquis de la inflorescencia. Aplicar foliarmente cuando el raquis tenga de 7 a 9 cm de longitud.	7	N/A
Vid	<i>Vitis vinifera</i> L.	12 a 70	6 a 35	0.19 a 1.14	Para raleo del racimo. Aplicar foliarmente al 40% de rajadura de caliptras.	7	N/A
Vid	<i>Vitis vinifera</i> L.	120 a 300	60 a 75	1.92 a 4.795	Para crecimiento de la baya. Aplicar en inmersión de racimo, cuando las bayas tengan de 4 a 6 mm de calibre, repitiendo la aplicación a los 8 a 10 mm de calibre.	7	N/A

UAC: Última Aplicación antes de la Cosecha. LMR: Límite Máximo de Residuos. N/A: No aplicable, exento de residuos

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN**

En tratamiento de tubérculo-semilla se aplica una sola vez a la dosis indicada en la etiqueta. Se aplica antes de la siembra. No aplicar cuando se haya iniciado el crecimiento de los brotes.

**PERIODO DE REINGRESO**

El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

No mezclar con productos fertilizantes y/o productos alcalinos, tales como Caldo bordelés, hidróxidos, etc. Incompatible con ácidos anhidridos, ácidos fuertes, agentes oxidantes y halógenos y productos a base de Aluminio.

**FITOTOXICIDAD**

**N-LARGE Premier 6.26%** no causa fitotoxicidad cuando es usado a las dosis indicadas en la etiqueta.



## PRECAUCIÓN



15 cm

16 cm

15 cm

46 cm