

Etiqueta para envase en presentación de 5 L.
Formulador: Stoller Enterprises, Inc.

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiqueta y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, overol de dos piezas, botas de goma, careta de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido N-LARGE Premier 6.26% debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No almacenar en casa habitación.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar en envase original, bajo sombra, en lugar fresco, seco y ventilado, fuera de la exposición directa del sol.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Giberelinas.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada, ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No tiene antídoto, tratar sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Teléfono de Stoller Perú: 391 0388

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición
Ácido Giberélico (GA3)..... 68.9 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PBUA N° 155 – SENASA

Titular de Registro: Stoller Perú S.A.
Av. Javier Prado Oeste 757 Dpto. 1006, Magdalena del Mar
Lima – Perú.
Central telefónica: (+51) 391 0388
e-mail: ventas@stoller.com.pe www.stoller.pe

Formulador: Stoller Enterprises, Inc.
9090 Katy Freeway, Suite 400
Houston, Texas 77024, Estados Unidos de Norteamérica.

Importador y Distribuidor: Stoller Perú S.A.



Contenido Neto: 5 L

N° de Lote:
Fecha de Formulaci3n:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Agite antes de usar.
- N-LARGE Premier 6.26% puede aplicarse en el recipiente de mezcla con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes foliares, debiendo de ser agregado en el siguiente orden:
1. AGUA 2. FERTILIZANTE FOLIAR 3. N-LARGE Premier 6.26% 4. PLAGUICIDA
- N-LARGE Premier 6.26% puede aplicarse vía foliar y en tratamiento de semilla.
- N-LARGE Premier 6.26 % se aplica preparando una solución a la dosis indicada en el cuadro de dosificaciones.
- Para tratamiento de tubérculo semilla: Preparar la solución de remojo a la dosis indicada en el cuadro de dosificación.
- Sumergir la semilla durante un periodo de 10 a 20 minutos. No aplicar después el crecimiento de los brotes.
- Tratamiento vía foliar: Aplicar en solución concentrada a diluida en suficiente volumen de agua para asegurar el mojado completo de la planta. Para el caso de vid es importante el mojado de racimos y bayas.
- Para aplicación de la solución vía foliar se puede emplear mochila de mano o de motor, motobomba o avión.
- El equipo de aplicación debe estar en perfectas condiciones. Para calibrar el equipo realizar una prueba en blanco, determinando el volumen de agua gastado en la aplicación.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 7 días después de la aplicación.

Modo de acción: N-Large Premier es un regulador de crecimiento de acción sistémica.

Mecanismo de acción: El Ácido Giberélico es una hormona vegetal que ocurre naturalmente en las plantas. Es absorbido a través de la hoja, ramas jóvenes, semillas y frutos. El Ácido giberélico es transportado hacia las partes en crecimiento activo de la planta junto con el Ácido Giberélico endógeno para estimular la división y elongación celular que afecta a las hojas, así como también a los tallos (eventualmente afecta el desarrollo del fruto y cuajado). Las aplicaciones de Ácido Giberélico pueden también apresurar la maduración de la planta y la germinación de la semilla.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo		Dosis		Momento de aplicación	PC (días)	LMR (ppm)
Nombre común	Nombre científico	(%)	cc / 200 L agua			
Papa	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0.00625% - 0.0250%	12.5 - 50	Aplicar antes de la siembra.	N.A.	N.A.

Cultivo		Dosis		Momento de aplicación	PC (días)	LMR (ppm)
Nombre común	Nombre científico	g i.a./Ha	ppm			
Alcachofa	<i>Cynara scolymus</i> L.	2 - 4	10 - 20	Previo a la inducción de capítulos florales.	N.A.	N.A.

Cultivo		Dosis		Momento de aplicación	PC (días)	LMR (ppm)
Nombre común	Nombre científico	g i.a./Ha	ppm			
Vid	<i>Vitis vinifera</i> L.	12 - 70	6 - 35	Elongamiento del raquis (7 a 9 cm longitud)	N.A.	N.A.
Vid	<i>Vitis vinifera</i> L.	12 - 70	6 - 35	40% rajadura de caliptras.	N.A.	N.A.
Vid	<i>Vitis vinifera</i> L.	120 - 300	60 - 75	Crecimiento de baya (4 a 6 mm y 8 a 10 mm calibre)	N.A.	N.A.
Palto	<i>Persea americana</i> L.	12 - 23	6 - 11.5	Crecimiento del fruto.	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días). LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm). N.A.: No Aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Papa: Una aplicación por campaña, previo a la siembra.

Alcachofa: Realizar dos aplicaciones por campaña, a intervalo de 15 días.

Uva: La frecuencia y época de aplicación dependerán del objetivo a lograr. Revisar el cuadro de dosis de uso.

Palto: Realizar dos aplicaciones por campaña. Dosis indicada para un volumen de agua de 800 L/Ha.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos fertilizantes y/o productos alcalinos, tales como Caldo bordelés, hidróxidos, etc. Incompatible con ácidos anhídridos, ácidos fuertes, agentes oxidantes y halógenos y productos a base de Aluminio.

FITOTOXICIDAD

N-LARGE Premier 6.26% no causa fitotoxicidad cuando es usado a la dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



PRECAUCIÓN



15 cm

16 cm

15 cm

46 cm