Etiqueta para envase en presentación de 20 L.
Formulador: Stoller Enterprises, Inc.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiqueta y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, overol de dos piezas, botas de goma, careta de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido N-LARGE Premier 6.26% debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No almacenar en casa habitación.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar en envase original, bajo sombra, en lugar fresco, seco y ventilado, fuera de la exposición directa del sol.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Giberelinas.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada, ni induzca el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No tiene antídoto, tratar sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
Teléfono de Stoller Perú: 391 0388

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

N-LARGE Premier 6.26%

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición

Ácido Giberélico (GA_3)..... 68.9 g/L
Aditivos c.s.p. ..... 1 L

Reg. PBUA Nº 155 – SENASA

Titular de Registro: Stoller Perú S.A.
Av. Javier Prado Oeste 757 Dpto. 1006, Magdalena del Mar.
Lima – Perú.
Central telefónica: (+51) 391 0388
e-mail: ventas@stoller.com.pe www.stoller.pe

Formulador: Stoller Enterprises, Inc.
9090 Katy Freeway, Suite 400
Houston, Texas 77024, Estados Unidos de Norteamérica.

Importador y Distribuidor: Stoller Perú S.A.

Contenido Neto: 20 L

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Agite antes de usar.
- N-LARGE Premier 6.26% puede aplicarse en el recipiente de mezcla con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes foliares, debiendo de ser agregado en el siguiente orden:
  1. AGUA 2. FERTILIZANTE FOLIAR 3. **N-LARGE Premier 6.26 %** 4. PLAGUICIDA
- N-LARGE Premier 6.26% puede aplicarse vía foliar y en tratamiento de semilla.
- N-LARGE Premier 6.26 % se aplica preparando una solución a la dosis indicada en el cuadro de dosificaciones.
- Para tratamiento de tubérculo semilla: Preparar la solución de remojo a la dosis indicada en el cuadro de dosificación. Sumergir la semilla durante un periodo de 10 a 20 minutos. No aplicar iniciado el crecimiento de los brotes.
- Tratamiento vía foliar: Aplicar en solución concentrada o diluida en suficiente volumen de agua para asegurar el mojamiento completo de la planta. Para el caso de vid es importante el mojamiento de racimos y bayas.
- Para aplicación de la solución vía foliar se puede emplear mochila de mano o de motor, motobomba o avión.
- El equipo de aplicación debe estar en perfectas condiciones. Para calibrar el equipo realizar una prueba en blanco, determinando el volumen de agua gastado en la aplicación.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 7 días después de la aplicación.

Modo de acción: N-Large Premier es un regulador de crecimiento de acción sistémica.
Mecanismo de acción: El Ácido Giberélico es una hormona vegetal que ocurre naturalmente en las plantas. Es absorbido a través de la hoja, ramas jóvenes, semillas y frutos. El Ácido giberélico es transportado hacia las partes en crecimiento activo de la planta junto con el Ácido Giberélico endógeno para estimular la división y elongación celular que ayuda a las hojas, así como también a los tallos (eventualmente afecta el desarrollo del fruto y cuajado).
Las aplicaciones de Ácido Giberélico pueden también apresurar la maduración de la planta y la germinación de la semilla.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo		Dosis		Momento de aplicación	PC (días)	LMR (ppm)
Nombre común	Nombre científico	(%)	cc / 200 L agua			
Papa	*Solanum tuberosum* L	0.00625% - 0.0250%	12.5 - 50	Aplicar antes de la siembra.	N.A.	N.A.

Cultivo		Dosis			Momento de aplicación	PC (días)	LMR (ppm)
Nombre común	Nombre científico	g i.a./Ha	ppm	cc / 200 L agua			
Alcachofa	*Cynara scolymus* L.	2 - 4	10 - 20	32 - 64	Previo a la inducción de capítulos florales.	N.A.	N.A.

Cultivo		Dosis			Momento de aplicación	PC (días)	LMR (ppm)
Nombre común	Nombre científico	g i.a./Ha	ppm	L/Ha			
Vid	*Vitis vinifera* L.	12 - 70	6 - 35	0.19 - 1.14	Elongamiento del raquis (7 a 9 cm longitud)	N.A.	N.A.
Vid	*Vitis vinifera* L.	12 - 70	6 - 35	0.19 - 1.14	40% rajadura de caliptras.	N.A.	N.A.
Vid	*Vitis vinifera* L.	120 - 300	60 - 75	1.92 - 4.795	Crecimiento de baya (4 a 6 mm y 8 a 10 mm calibre)	N.A.	N.A.
Palto	*Persea americana* L.	12 - 23	6 – 11.5	0.188 a 0.375	Crecimiento del fruto.	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia (días). LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm). N.A: No Aplica.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN
Papa: Una aplicación por campaña, previo a la siembra.
Alcachofa: Realizar dos aplicaciones por campaña, a intervalo de 15 días.
Uva: La frecuencia y época de aplicación dependerán del objetivo a lograr. Revisar el cuadro de dosis de uso.
Palto: Realizar dos aplicaciones por campaña. Dosis indicada para un volumen de agua de 800 L/Ha.

PERIODO DE REINGRESO
El periodo de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD
No mezclar con productos fertilizantes y/o productos alcalinos, tales como Caldo bordalés, hidróxidos, etc. Incompatible con ácidos anhídridos, ácidos fuertes, agentes oxidantes y halógenos y productos a base de Aluminio.

FITOTOXICIDAD
N-LARGE Premier 6.26% no causa fitotoxicidad cuando es usado a la dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".



PRECAUCIÓN

15 cm 16 cm 15 cm

46 cm

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE STOLLER S.A.