

28.5 cm

1 cm

0.8 cm

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto puede ser mortal si se ingiere (DL50 oral en ratas: 422 mg/kg pc).
- Este producto es peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- Este producto causa daño temporal a los ojos, utilice protección ocular.
- Evite cualquier contacto de gestantes con este producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con personas, animales, alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, overol, botas de goma, gafas y respirador con filtros para solventes orgánicos) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Glicósidos Lactone Macroclínicos
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera por la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten solicite atención médica inmediatamente.
- En caso de ingestión accidental del producto, no inducir al vómito. No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente, solicitar atención médica inmediatamente.
- En caso de inhalación trasladar a la persona a un lugar fresco con ventilación natural.
- Nota al médico: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de fortalecimiento.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CROP BUSINESS SAC: 349-2669

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# VERTIPLUS 18 EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**Composición:**

Abamectin ..... 18 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 755 - SENASA  
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:

**CROP BUSINESS S.A.C.**



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

**Contenido Neto: 4 L**

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

HONBOR INDUSTRIAL CO., LTD

30/F, Golden Center Tower N° 3037

Jintian Road CBD Futian, Shenzhen

CHINA

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**VERTIPLUS 18 EC** es un insecticida-acaricida utilizado para el control de Ácaro del tostado y Mosca minadora en los cultivos de mandarina y papa respectivamente.

**VERTIPLUS 18 EC** actúa por contacto e ingestión, además tiene actividad traslaminar sistémica localizada en la planta.

**VERTIPLUS 18 EC** actúa además sobre todos los estados larvales que minan dentro de la hoja, también manifiesta un efecto secundario sobre las hembras adultas al esterilizarlas, afectando la oviposición.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVOS  | PLAGA               |                                  | DOSIS    |         | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|---------------------|----------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común        | Nombre Técnico                   | L/200 L  | L/Ha    |                |                 |
| Mandarina | “Ácaro del tostado” | <i>Phyllocoptruta oleivora</i>   | 0.1      | 0.5     | 7              | 0.01            |
| Papa      | “Mosca minadora”    | <i>Liriomyza huidobrensis</i>    | 0.2      | 0.4     | 14             | 0.01            |
| Vid       | “Ácaro”             | <i>Colomerus vitis</i>           | 0.2      | -       | 28             | 0.01            |
| Palto     | “Ácaro”             | <i>Oligonychus punicae</i>       | 0.2      | -       | 14             | 0.01            |
| Pimiento  | “Ácaro hialino”     | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | 0.15-0.2 | 0.3-0.4 | 7              | 0.02            |

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (partes por millón)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** **VERTIPLUS 18 EC** debe ser aplicado cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. El momento oportuno de aplicación será cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña/año para mandarina y 4 aplicaciones por año (2 aplicaciones por campaña) para el cultivo de papa. No se debe aplicar **VERTIPLUS 18 EC** en cultivos y plantas durante la floración, ya que es tóxico para abejas.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **VERTIPLUS 18 EC** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción alcalina, agentes ácidos u oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD:** **VERTIPLUS 18 EC** no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

15 cm

2.2 cm



**NOMBRE COMERCIAL**

**NEGRO C:0 M:0 Y:0 K:100**

**PICTOGRAMA**

**Banda toxicológica** Pantone Yellow  
C:0 M:0 Y:100 K:0