

PRECAUCIONES MANIPULEO, ALMACENAJE, TRANSPORTE.

Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños.

- No fumar, comer ni beber durante la mezcla y aplicación de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y bañarse
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.

NOTA AL MEDICO

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

- DL 50 ORAL>5000 mg/Kg
- DL 50 DERMAL>2000 mg/Kg

NOTA AL COMPRADOR

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MAXTRIN 0.5 SL

(MATRINE)

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Matrine.....5 g/l

Aditivos.....c.s.p 1 l

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRICOLA

Reg. PBUA N° - SENASA

Titular del Registro: FITOCORP SAC
Calle: Los Tejedores 187 - Vulcano-Ate

Formulador: Shandong Xinghe Crop Technology CO. LTD. 230# of the N° 308. National Highway, Tianqiao, District, Beijing, China.

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 1 Litro
Lote Nro.
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

INDICATIVOS DE USO

MAXTRIN 0.5 SL es un insecticida biológico con acción principalmente de contacto. Utilice **MAXTRIN 0.5 SL** como tratamiento preventivo.

SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACIÓN

Para aplicar este producto no se requiere premezcla, se vacía directamente en el tanque de mezcla definitiva. Debe dispersarse en todo el agua sin que haya asentamientos, por ello es necesario agitar. Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

Aplique **MAXTRIN 0.5 SL** cuando aparezcan las primeras infestaciones de la plaga.

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS L/cil (200L)	UAC* (Días)	LMR* (p.pm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.300	ND	ND

*U.A.C: Última aplicación antes de la cosecha en días.
*L.M.R: Limite Máximo de Residuos.

COMPATIBILIDAD

No pre mezclar **MAXTRIN 0.5 SL** con otro componentes antes de añadir al tanque de aplicación si no se conoce previamente su compatibilidad

No se conoce incompatibilidades con la mayoría de plaguicidas, evitar uso con agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni en los frutos en que se recomienda si se emplea la dosis indicada.

“Manténgase alejado de las personas, animales , productos alimenticios y medicinales”



**LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCIÓN**

“Destruya este envase inmediatamente después de usar el producto”.

