

30.0 cm

2.0 cm

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN.**

- No fumar, comer ni beber durante la mezcla y aplicación de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lavar la ropa contaminada y bañarse.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y bajo sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.
- Nota al médico, no tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.**

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE.**

- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua.
- No tiene efecto negativo sobre la fauna benéfica y/o silvestre.
- No contaminar con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes de productos o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua, de la menos 5 metros.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios.



# Maxtrin® 0.5 SL

**EXTRACTO VEGETAL  
INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE - SL**

**Composición:**

Matrine ..... 5 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PBUA N° 336 - SENASA**

**Titular del Registro:**

**AVGUST PERU SAC**

Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.

Formulado por:

Shandong Xinghe Crop Technology CO. LTD

Importador y Distribuidor:



Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **MAXTRIN 0.5 SL** es un insecticida biológico con acción principalmente de contacto.
- Utilice **MAXTRIN 0.5 SL** como tratamiento preventivo.
- Para aplicar este producto no se requiere pre-mezcla, se vacía directamente en el tanque de mezcla definitiva.
- Debe dispersarse en toda el agua sin que haya asentamientos, por ello es necesario agitar.
- Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión.
- Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme.
- Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.
- Aplicar **MAXTRIN 0.5 SL** cuando aparezcan las primeras infestaciones de la plaga.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVOS	Nombre de la Plaga		Dosis (L / 200L)	P.C. (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.300	NA	NA
Palto	Acaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.15-0.2	Exento	Exento
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.2 - 0.25	NA	NA
Fresa	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0.2 - 0.25	Exento	Exento
Vid	Chanchito blanco	<i>Planococcus ficus</i>	0.3	Exento	Exento
Arándano	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.3	Exento	Exento

P.C.: Período de carencia(días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos(ppm:partes por millón)

NA: No aplica

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Puede ser aplicado en cualquier estado fenológico del cultivo, al inicio de la infestación de la plaga, la frecuencia de acuerdo con las recomendaciones del asesor técnico.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada antes de 24 horas desde la aplicación, a menos que se vista ropa de protección.

**COMPATIBILIDAD**

No pre mezclar **MAXTRIN 0.5 SL** con otro componentes antes de añadir al tanque de aplicación si no se conoce previamente su compatibilidad No se conoce incompatibilidades con la mayoría de plaguicidas, evitar uso con agentes oxidantes fuertes.

**FITOTOXICIDAD**

No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni en los frutos en que se recomienda si se emplea la dosis indicada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

15.0 cm



## PRECAUCIÓN

