PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- La aplicación de **MET-21** debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de extractos vegetales de uso agrícola de Categoría Toxicológica III (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas y gafas).
- No ingerir.
- No se exponga al contacto, ni respire la neblina a vapores provenientes de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

- MET-21 no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químicos.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y airado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y las altas temperaturas.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto:

- Ingestión: Solamente cuando se está consciente, enjuagar la boca, dar mucho agua a beber (aprox. 500 ml) No provocar el vómito. Siempre consultar al médico.
- Inhalatorio: No contiene sustancias volátiles.
- Ocular: Lavar inmediatamente durante tanto tiempo como sea posible con mucho agua. Los párpados deberán mantenerse separados del globo ocular para asegurar el lavado completo. Siempre consultar al médico.
- Dérmico: Lavar con abundante agua y jabón. Lavar la ropa antes de usarla nuevamente.

NOTA AL MEDICO:

En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente muéstrele una copia de esta etiqueta.

DL50 ORAL AGUDA: >2000 mg/kg de peso corporal.
DL50 DERMAL: >2000 mg/kg de peso corporal

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

NOTA AL COMPRADOR

El titular del registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

NO INFLAMABLE

MET-21

(Metharizium anisopliae & Beauveria bassiana)

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición Química: g/L

Metharizium anisopliae..... 0.15 %
Beauveria bassiana.....0.15 %
Aditivos.....c.s.p. 100 %
(*Concentracion 10^{12} UFC*)

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N°: -SENASA

Titular del Registro:
TERRAGÉNESIS PERÚ S.A.C.
Car. Panamericana Piura-Sullana Km. 4.5 Lote. 1 Int. 15
Z.I. ECOMAPSA (BODEGA Nº 15) PIURA - PIURA

Formulado y/o distribuido por:
TERRAGÉNESIS PERÚ S.A.C.
Car. Panamericana Piura-Sullana Km. 4.5 Lote. 1 Int. 15
Z.I. ECOMAPSA (BODEGA Nº 15) PIURA - PIURA

TERRA GENESIS

N° de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :
Contenido Neto:1 Lt.

INDICATIVOS DE USO

Modo de acción:

- Dentro de un plan de manejo orgánico se ha demostrado su eficacia en el control efectivo sobre Homopteros, Hemipteros y Dipteros (Aphidos, langostinos y Pseudoccocus).
- Es una mezcla de hongos entomopatogenos de origen natural.
- Su acción es de contacto. Efectivo sobre insectos succionadores del follaje.
- No afecta a mamíferos, abejas y aves.
- No daña la fruta, no produce manchas ni aromas.
- No mezclar con azufre ni productos alcalinos.
- Evitar rangos altos de pH en el tanque de aplicación.

- Acción: Control de larvas de suelo de insectos.
- Periodo de uso: En toda la temporada una vez aparezca la plaga.
- Forma de uso: Suelo y/o follaje.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

- En una medida para pesticidas, medir la cantidad recomendada del producto en un poco cantidad de agua, agitar hasta lograr una mezcla uniforme, luego verter en el estanque de preparación de productos del sistema de riego.
- En aplicaciones al suelo no se debe usar coadyuvantes, al follaje usar un coadyuvante siliconado para mejorar la humectación en los tejidos vegetales.
- Asperjar con buen volumen de agua a fin de lograr una cobertura uniforme.

Cuadro de Usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	UAC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus citri*	2.0	Exento	Exento

LMR: Límite Máximo de Residuos
UAC: Última Aplicación antes de la Cosecha

COMPATIBILIDAD

Es compatible con insecticidas químicos y fertilizantes foliares.

FITOTOXICIDAD

No presenta Fitotoxicidad.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS , ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS



LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO