

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- La aplicación de **INBIOL** debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de extractos vegetales de uso agrícola de Categoría Toxicológica III (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas y gafas).
- No ingerir.
- No se exponga al contacto, ni respire la neblina a vapores provenientes de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- **INBIOL** no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químicos. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y airado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y las altas temperaturas.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto:

- **Ingestión:** Solamente cuando se está consciente, enjuagar la boca, dar mucho agua a beber (aprox. 500 ml) No provocar el vómito. Siempre consultar al médico.
- **Inhalatorio:** No contiene sustancias volátiles.
- **Ocular:** Lavar inmediatamente durante tanto tiempo como sea posible con mucho agua. Los párpados deberán mantenerse separados del globo ocular para asegurar el lavado completo. Siempre consultar al médico.
- **Dérmico:** Lavar con abundante agua y jabón. Lavar la ropa antes de usarla nuevamente.
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente muéstrela una copia de esta etiqueta.

DL50 ORAL AGUDA: >2000 mg/kg de peso corporal.

DL50 DERMAL AGUDA: >4000 mg/kg de peso corporal.

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

NOTA AL COMPRADOR


El titular del registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES



INBIOL

(*Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae*)

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Metarhizium anisopliae..... 0.09 %

Beauveria bassiana0.21 %

Aditivos.....c.s.p. 100 %

(Concentración 10^{12} UFC)

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Registro PBUA N°: 334-SENASA

Titular del Registro:

TERRAGÉNESIS PERÚ S.A.C.

Car. Panamericana Piura-Sullana Km. 4.5 Lote. 1 Int. 15

Z.I. ECOMAPSA (BODEGA N° 15) PIURA - PIURA

Formulado y/o distribuido por:

TERRAGÉNESIS PERÚ S.A.C.

Car. Panamericana Piura-Sullana Km. 4.5 Lote. 1 Int. 15

Z.I. ECOMAPSA (BODEGA N° 15) PIURA - PIURA



N° de lote :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

Cont. Neto: 200 Lts.

INDICATIVOS DE USO

Modo de acción:

- Dentro de un plan de manejo orgánico se ha demostrado su eficacia en el control efectivo sobre Homopteros, Hemipteros y Dipteros (Aphidos, langostinos y Pseudococcus).
- Es una mezcla de hongos entomopatógenos de origen natural.
- Su acción es de contacto. Efectivo sobre insectos succionadores del follaje.
- No afecta a mamíferos, abejas y aves. No daña la fruta, no produce manchas ni aromas.
- No mezclar con azufre ni productos alcalinos.
- Evitar rangos altos de pH en el tanque de aplicación.
- Acción: Control insectos.
- Periodo de uso: En toda la temporada una vez aparezca la plaga.
- Forma de uso: Suelo y/o follaje.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

- En una medida para pesticidas, medir la cantidad recomendada del producto en un poco cantidad de agua, agitar hasta lograr una mezcla uniforme, luego echar en el cilindro de aplicación.
- Es preferible usar un coadyuvante siliconado para mejorar la humectación en los tejidos vegetales.
- Asperjar con buen volumen de agua a fin de lograr una cobertura uniforme.

Cuadro de Dosis:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	UAC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.5	Exento	Exento

LMR: Límite Máximo de Residuos

UAC: Última Aplicación antes de la Cosecha

COMPATIBILIDAD

Es compatible con insecticidas químicos y fertilizantes foliares.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad.

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO

