

HEILEM 75 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Tebuconazole	500 g/kg
Trifloxystrobin	250 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 1255 - SENASA
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y Distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Calle Toledo N° 161 Dpto. 201 Urbanización
Mayorazgo IV Etapa - ATE - LIMA
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto: 100 g
Fecha de vencimiento:

Formulado por:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Songjiang District, Shanghai
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco y ventilado.
 - No usar el envase para conservar alimentos ni agua para consumo.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos bebidas, medicinas ni forrajes.
 - Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
 - Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - El producto puede ser nocivo por ingestión e inhalación.
 - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Triazol + Estrobilina
 - En caso de intoxicación, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no provoque el vómito, ni dar beber agua a la persona si está inconsciente.
 - En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y lavar la piel con abundante agua y jabón.
 - En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplicar respiración artificial si fuera necesario.
 - No tiene antidoto, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669
CISPROQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobranes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **HEILEM 75 WG**, es un fungicida sistémico, cuyos ingredientes activos actúan de manera complementaria, el tebuconazole inhibe la síntesis del ergosterol, mientras que el trifloxystrobin afecta la respiración celular, logrando la muerte del hongo.
- **HEILEM 75 WG** se aplica en aspersión, previa mezcla con agua. Realizar una premezcla en un volumen menor de agua; agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Usar preferentemente agua con un pH entre 6.8 a 7.5. Aplicar con cualquier equipo convencional terrestre en buen estado y debidamente calibrado.
- **FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
- Aplicar previa evaluación de la plaga.
En Cebolla: cuando se encuentre en campo el 5% de hojas afectadas, especialmente en la etapa de engrosamiento del bulbo.
En Vid: cuando se observen los primeros síntomas en brotes verdes y cuando encuentre un 20% de inflorescencias afectadas.
En Arroz: cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, no mayor al 5% de severidad, durante la época de macollamiento y formación de panícula.
En Café: para el control de Ojo de gallo, usar la menor dosis a inicios de la enfermedad. El gasto de agua es de 200 Lt/ha.
- Número máximo de aplicaciones
En Cebolla: máximo aplicar 01 aplicación por campaña, considerando 2 campañas/año.
En Vid: máximo aplicar 02 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña/año, con un volumen de gasto de agua máximo de 1000 litros por hectárea.
En Arroz: máximo aplicar 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 a 14 días; considerando 2 campañas al año.
- No aplicar **HEILEM 75 WG**, consecutivamente, sino alternar con otro fungicida de diferente modo de acción.
- **PERIODO DE REINGRESO**
Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.
- **COMPATIBILIDAD**
HEILEM 75 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente ácidas, alcalinas u oxidantes.
- **FITOTOXICIDAD**
El producto **HEILEM 75 WG** no es fitotóxico cuando es utilizado según lo indicado en la etiqueta.
- **RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200 L	kg/ha	%		
Cebolla	Punta seca	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	0.3 - 0.5	-	14	0.02
Vid	Idium	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.3	0.03	21	2.0*
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3 - 0.35	0.03 - 0.035	-	5.0**
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.2 - 0.25	-	35	0.02
Café	Roya del café	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.2	-	-	30	0.1*
	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	0.15 - 0.2	-	-	-	0.05**
Pimiento		<i>Leveillula taurica</i>	0.125	0.25	-	7	0.5*

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carencia *Tebuconazole **Trifloxystrobin

