" LEA TOTALMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación ocular moderada.
- Dañino si se absorbe a través de la piel.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico**:** Cloronitrilo.
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalo después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar airado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- **Nota al Médico.** No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMEGENCIA
CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4/ 0801-10200
CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

FURONIL 720 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada SC

COMPOSICION QUIMICA:

Chlorotalonil.....720 g/L

Aditivos.....c.s.p 1L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular, Importador y Distribuidor:

FITOCORP SAC
Calle Los Tejedores 187.
Vulcano. Ate

Formulado y fabricado por:
Kinyield Industry Co. Limited
Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China.

Contenido Neto: 1 LT
Lote Nro.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

No Corrosivo **No Inflamable** **No Explosivo**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FURONIL 720 SC es un fungicida protectante no sistémico de amplio espectro y con acción preventiva.

Antes de abrir el envase agite **FURONIL 720 SC,** fuertemente**.** Llenar el cilindro de mezcla que contenga hasta la mitad de agua aplicar, agregar la cantidad de **FURONIL 720 SC** a utilizar, agitar la mezcla hasta que sea homogénea y finalmente completar la otra mitad de agua. Luego, realizar la aplicación con cualquier equipo terrestre, realice la aplicación mediante pulverizadores manuales, atomizadores o equipo tractorizado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis	PC (Días)	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200 L		
Espárrago	Cercosporiosis	*Cecospora asparagi*	300-400	7	0.1
Cebolla	Alternariosis	*Alternaria porri*	500-600	7	0.5
Papa	Tizón temprano	*Alternaria solani*	500-750	14	0.2
Alcachofa	Moho gris	*Botrytis cynerea*	500-600	1	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Aplicar **FURONIL 720 SC** cuando el cultivo muestre los síntomas iniciales de la enfermedad. Se recomienda realizar una aplicación por campaña. Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

24 horas para ingresar al campo tratado.

COMPATIBILIDAD

FURONIL 720 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común., excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina. Al realizar la mezcla, se recomienda una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO